

## КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско име на лекарствения продукт

**Oleum Ricini**

**Рициново масло**

2. Количествен и качествен състав  
Castor oil, virgin 40 ml, 1000 ml

3. Лекарствена форма  
oral liquid (перорална течност)

4. Клинични данни

### 4.1. Показания

Слабително средство за краткотрайно лечение при запек.

### 4.2. Дозировка и начин на употреба

За възрастни: приема се вътрешно по 15-30 g (1-2 супени лъжици дневно), може да се приема с топло кафе или лимонов сок; за деца над 6 годишна възраст: (1-3 чаени лъжички дневно), може да се приеме и с мед в съотношение 1:1, или разбъркано с кристална захар. Маслото по възможност да се изсипва на задната половина на езика. Ефектът настъпва след 2-6 часа.

### 4.3. Противопоказания

Да не се прилага при отравяне с мастноразтворими вещества (бензол, фосфорогранични съединения и др.) и екстракт от мъжка папрат.

Да не се прилага при: хемороидални кръвотечения, възпалителни заболявания на коремните органи (перитонит, апендицит, язвен ентероколит, остръ холецистит и др.), запек вследствие на механични препятствия (илеус, инкарцерирана херния и др.), в менструалния период, при обща слабост и склонност към колапс, (особено реконвалесцентни изтощени болни и старческа възраст), при висока температура (особено при болни с отрицателен воден баланс), при спастичен запек и жълтеница. Да не се прилага при хроничен запек и остри и хронични бъбречни заболявания. Не се прилага при лечение с мъжка папрат. Продуктът да не се дава на деца под 6 годишна възраст.

### 4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Да не се използва при болки в стомаха, при позиви за повръщане, освен ако не е предписано от лекар. При кървене от ануса, или при кръв в изпражненията, приема на рициново масло трябва да се спре, тъй като това може да е индикация за сериозен проблем. Рициновото масло стимулира маточните контракции. Да не се приема късно вечер – ефектът настъпва в рамките на 2-6 часа. Да не се употребява продължително време, тъй като червата изгубват нормалната си перисталтика и при продължителна употреба може да има привикване.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № II-1438/109.08.05	
N=4/29.07.2005	УМ



#### **4.5. Лекарствени и други взаимодействия**

Продуктът задържа резорбцията в организма на мастноразтворимите витамини, което е нежелателно. Може да повлияе върху калий-задържащото действие на калий-съхраняващите диуретици.

#### **4.6. Бременност и кърмене**

Да не се употребява при бременност, тъй като стимулира маточните контракции.

#### **4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Не са наблюдавани.

#### **4.8. Нежелани лекарствени реакции**

Възможна е поява на алергични реакции.

Приложението на продукта може да предизвика привикване на организма при продължително приемане. Прилагането на лекарствения продукт може да е придружено с коликообразни болки, гадене и повръщане. При контакт с очите и/или кожата може да предизвика дразнене.

#### **4.9. Предозиране**

При предозиране е възможно да се усилят стомашните коликообразни болки и да предизвика гадене, повръщане, колики, тежка диария.

### **5. Фармакологични данни**

#### **5.1. Фармакодинамични свойства**

ATC код: A06AB05

Рициновото масло принадлежи към тъстите масла. Получава се от семената на рициновия храст *Ricinus communis* сем. Euforbiaceae, чрез пресоване на студено. При перорално приемане хидролизира в тънките черва под влияние на липазата на глицерин, рицинова, линолова, стеаринова и диоксистеаринова киселини. Тези киселини дразнят силно рецепторите на чревната лигавица и усилват чревната перисталтика. Дефекацията настъпва след 2-6 часа.

#### **5.2. Фармакокинетични свойства**

Рициновото масло не кумулира в организма, елиминира се чрез фекалиите след като в тънките черва се е хидролизирано до глицерин, рицинова, линолова, стеаринова и диоксистеаринова киселини.

#### **5.3. Предклинични данни за безопасност**

Лекарственият продукт притежава ниска токсичност и е добре поносим при орално приложение. Продължителното третиране на животни не показва данни за канцерогенност, тератогенност и ембриотоксичност.

### **6. Фармацевтични данни**

#### **6.1. Списък на помощните вещества и техните количества**

Не съдържа помощни вещества

#### **6.2. Физико-химични несъвместимости**

Не са известни



**6.3. Срок на годност**  
2 /две/ години

**6.4. Специални условия на съхранение**  
Да се съхранява на защитено от светлина място, в добре затворени опаковки, при температура под 25°C.

**6.5. Дани за опаковката**  
Бели непрозрачни бутилки от полипропилен от 40 ml и от 1000 ml, затворени с капачки на винт от полипропилен.

Върху бутилките са залепени етикети в съответствие с Наредба № 7 на МЗ от 22.06 2000 г./ДВ, бр. 54.

**6.6. Препоръки при употреба**  
Продуктът е за краткотрайно лечение на констипация. Не се препоръчва продължителното му приемане.

**7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба**  
ЕТ „Богомил Василев – Евелин 29“  
Гр. Перник, ул. Битоля № 17, тел 02 920 02 73

**8. Регистрационен номер**

**9. Дата на първо разрешаване на лекарствения продукт**

**10. Дата на актуализация на текста**

