

## *КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА*

### **1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

**ORTHO-GYNEST/ОРТО-ГИНЕСТ**

За вагинална естрогенна терапия.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 11-Ч0491/29.08.01	
610/ 26.06.01	<i>С. Симеонов</i>

### **2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

*0.01% вагинален крем*

*Активно вещество:*

*Estriol micronized      0.0103 g/100g*

*Помощи съставки:*

	<i>g/100 g</i>
<i>Peanut oil</i>	5.00
<i>Tegacid regular</i>	15.00
<i>Glycerol</i>	5.00
<i>Benzoic acid</i>	0.20
<i>Glutamic acid</i>	0.10
<i>Purified water</i>	74.69

Един апликатор, пълен с вагинален крем (5гр) съдържа 0.5 мг естриол.

### **3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА**

Вагинален крем - туви от 80 g с апликатор.

### **4. КЛИНИЧНИ ДАННИ**

#### **4.1. ПОКАЗАНИЯ**

Атрофични вагинити.



## **4.2. ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ**

Един пълен апликатор с крем се поставя дълбоко във влагалището веднъж дневно, за предпочтение преди лягане, 1 до 3 седмици. Поддържащо лечение - 1 апликатор 2 пъти седмично. Ако е необходима продължителна терапия, се прекъсва лечението за 1 месец след всеки 6 месечен курс на лечение.

## **4.3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Малигнени или преканцерозни изменения на вулвата, влагалището или матката.

Диагностициран или предполагаем рак на гърдата.

Недиагностицирано генитално кървене.

Диагностицирана или предполагаема бременност, кърмене.

Свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата.

## **4.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

В някои случаи продължителната употреба на Ортогинест, може да доведе до ендометриална хиперплазия и вагинално кървене. В тези случаи е необходимо спиране на лечението и изясняване на причината за кървенето.

## **4.5. БРЕМЕННОСТ/КЪРМЕНЕ**

Бременност- категория X.

Поради своя фетотоксичен ефект и риск от сериозни нежелани ефекти върху плода, естрогените не се използват по време на бременност и кърмене (преминават в кърмата) (виж Противопоказания).



#### **4.6. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

Рядко се наблюдават напрежение в гърдите, мастодиния, гадене, световъртеж и мигрена.

Могат да се наблюдават зацепване и увеличена секреция от влагалището.

Има съобщения за отоци и преходно увеличение на теглото, както и редки случаи на крампи на краката или така наречените “тежки крака”.

В редки случаи, може да се наблюдава локално парене (в началото на лечението), гадене, чувство за напрежение в долната част на корема, както и вагинални гъбични инфекции.

#### **4.7. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Не са наблюдавани взаимодействия при едновременното прилагане на други лекарства. Въпреки това трябва да се избягва едновременната терапия с други хормонални препарати, или това да става след строга преценка риск/полза.

#### **4.8. ПРЕДОЗИРАНЕ**

Токсичността на естриол е много ниска. Въпреки това при предозиране, както и неволно приемане от деца, не е изключена появата на токсичен ефект. В тези случаи могат да се наблюдават гадене и повръщане, вагинално кървене при момичета. При необходимост може да се направи стомашна промивка.

### **5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ**

#### **5.1. ФАРМАКОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА**

Орто-Гинест съдържа естествения хормон естриол, който действа специфично върху вулвата, влагалището и цервикса. Естриол стимулира регенерацията на атрофичния епител на вулвата и влагалището, като възстановява биологичното състояние и функция на влагалището.



препарата повлиява възпалението и сърбежа, предизвикани от атрофията, както и диспареунията.

Подобен е ефектът и върху уретралната лигавица, което води до значително намаляване на субективните симптоми, свързани с диспареунията.

Орто-Гинест има допълнителен положителен ефект върху "топлите вълни" и изпотяването.

Биопсия след 4 седмично лечение с препарата показва лека до умерена ендометриална пролиферация. След 3 месечно лечение със супозитории Орто-гинест не е наблюдавана ендометриална хиперплазия.

## 5.2. ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ СВОЙСТВА

Вагиналното приложение на естриол има предимно локален ефект. Въпреки това се наблюдава временно увеличение на серумните нива приблизително с около 30 пъти, в сравнение с изходните стойности.

След вагинално приложение на естриол около 20% от дозата достига до системното кръвообръщение в непроменен вид. При вагинално приложение на 0.5 mg естриол се достигат серумни нива, сравними с тези при приложение на 10 mg естриол орално.

Изходни нива се достигат след 8 часа. При прилаганата дневна доза не е наблюдавана кумулация на препарата. Ако дозировката бъде намалена на 2 пъти седмично серумните нива на естриола остават в рамките на нормата.

## 6. СРОК НА ГОДНОСТ

2 години

## 7. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

На стайна температура (под 25 градуса).

Да не се използва след изтичане на посочения срок на годност.

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

CILAG AG INTERNATIONAL  
Hochstrasse 201, Switzerland

