

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

NIZORAL® cream
НИЗОРАЛ® крем

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № II-12894 28.04.06	
694/11.04.06	М. Симеонов

1. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

NIZORAL® CREAM

НИЗОРАЛ® КРЕМ

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

В един грам се съдържат 20 mg кетоконазол.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Крем за локално приложение върху кожата.

4. КЛИНИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

4.1. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Низорал крем се предписва за локално приложение при лечението на дерматофитни инфекции на кожата: дерматомикози на тялото, на ръцете, бедрените свивки и краката, причинени от *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*, както и при лечението на кандидоза на кожата и разноцветен лишай.

Низорал крем се предписва също и за лечението на себореен дерматит - състояние на кожата, свързано с наличието на *Pityrosporum ovale*.

4.2. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кандидоза на кожата, дерматомикози на тялото, на ръцете, бедрените свивки, краката и разноцветен лишай: Препоръчва се Низорал крем 2 % да се нанася веднъж дневно, така че да покрие поразения участък и непосредствено заобикалящата го повърхност.

Себореен дерматит: Низорал крем 2 % трябва да се нанася върху поразения участък веднъж или два пъти дневно, в зависимост от тежестта на инфекцията.

Лечението следва да бъде продължено достатъчно дълго, поне няколко дни след изчезване на всички симптоми. Диагнозата трябва да бъде преразгледана, ако не настъпи клинично подобреие след 4-седмично лечение. Следва да се спазват общи мерки по отношение на хигиената, за да се контролират източниците на инфекция и подновена инфекция.

Обичайната продължителност на лечението е: разноцветен лишай 2-3 седмици, дрождни инфекции 2-3 седмици, дерматомикози на бедрените свивки 2-4 седмици, на тялото 3-4 седмици и на краката 4-6 седмици.



NIZORAL® cream – Кратка характеристика на продукта

Обичайната продължителност на лечението при себореен дерматит е 2 до 4 седмици. При себореен дерматит се прилага поддържащо лечение веднъж или два пъти седмично.

4.3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Низорал крем е противопоказан при лица със свръхчувствителност към някоя от съставките.

4.4. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Низорал крем не е предписан за употреба в офтальмологията.

С цел предотвратяване на вторично раздразнение след прекратяване на продължително лечение с кортикоステроиди за локално приложение, се препоръчва продължаване на прилагането на кортикостероида сутрин и на Низорал крем вечер и впоследствие постепенно оттегляне на стероидната терапия в рамките на 2-3 седмици.

4.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не са известни.

4.6. БРЕМЕННОСТ И ЛАКТАЦИЯ

Употреба по време на бременност и през периода на лактация не оказва въздействие, тъй като Низорал крем, приложен локално, не се резорбира.

4.7. ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не са известни.

4.8. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Наблюдавани са няколко случая на дразнене и парещо усещане по време на лечение с Низорал крем. Също така, в редки случаи, алергични кожни прояви, като контактен дерматит, са свързвани с Низорал крем или някоя от неговите съставни части, а именно натриев сулфит или пропиленгликол.

4.9. ПРЕДОЗИРАНЕ

Симптоми

Прекомерната локална употреба може да предизвика зачервяване, оток и парещо усещане, които обикновено изчезват след преустановяване на лечението.

Лечение

Не са необходими специални мерки при неволно погълдане на препарата.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1. ФАРМАКОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА

Кетоконазол е синтетично имидазол-диоксоланово производно с мощно антимикотично действие срещу дерматофити, като *Trichophyton sp.*, *Epidemophyton floccosum* и *Microsporum sp.*, и срещу дрожди. Действието на кетоконазол е особено изразено срещу *Candida albicans*.



NIZORAL® cream – Кратка характеристика на продукта

Обикновено кетоконазол крем въздейства много бързо върху сърбежа, който често се наблюдава при дерматофитни и дрождни инфекции, както и при състояния на кожата, свързани с наличието на *Pityrosporum* sp. Това симптоматично подобреие се забелязва преди да се наблюдават първите признания на излекуване.

5.2. ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ СВОЙСТВА

Низорал крем не пораждаоловими кръвни нива след локално приложение.

5.3. ПРЕДКЛИНИЧНИ ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не се различават от съществуващите такива.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1. СЪСТАВ

Помощни вещества

Propylene glycol, Stearyl alcohol, Cetyl alcohol, Sorbitan monostearate, Polysorbate 60, Isopropyl myristate, Sodium sulfite anhydrous, Polysorbate 80, Purified water

6.2. НЕСЪВМЕСТИМОСТИ

Не са известни.

6.3. СРОК НА ГОДНОСТ

5 години.

6.4. СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

При температура до 30°C.

Да се държи на недостъпно за деца място.

6.5. ОПИСАНИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Низорал крем се произвежда в тубички по 15 г.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Johnson & Johnson D.O.O.

Šmartinska 140

1000 Ljubljana

Slovenia

8. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

20010017

9. ДАТА НА ПОСЛЕДНО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ТЕКСТА

м. март 2006 г.

