



699/20.06.06

1 ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Macropen® granules for oral suspension 175 mg/5 ml

Макропен гранули за суспенсия за перорално приложение 175 mg/5 ml

2 КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

5 ml от суспенсията за перорално приложение (1 мерителна лъжичка) съдържат 175 mg midecamycin acetate (miocamycin).

За помощните вещества виж 6.1.

3 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Гранули за суспенсия за перорално приложение: оранжев, фино гранулиран прах, с лек мирис на банан.

4 КЛИНИЧНИ ДАННИ**4.1 Терапевтични показания**

Инфекции на дихателните и пикочно-половите пътища, предизвикани от микоплазми, легионели, хламиидии и *Ureaplasma urealyticum*; инфекции на дихателните пътища, инфекции на кожата и подкожните тъкани и други инфекции, причинени от бактерии, чувствителни към midecamycin и пеницилин, при пациенти със свръхчувствителност към пеницилин; ентерит, предизвикан от бактерии от рода *Campylobacter*; лечение и профилактика на дифтерия и коклюш.

4.2 Дозировка и метод на приложение

Лекарството трябва да се приема преди хранене.

Деца с тегло под 30 kg: 20 до 40 mg/kg телесно тегло дневно от пероралната суспенсия, разделени на три приема, или 50 mg/kg телесно тегло дневно, разделени на два, а при тежки инфекции - на три приема.

Препоръчана схема на дозиране при деца (дневна доза от 50 mg/kg т.т.):

Деца	Перорална суспенсия 175 mg/5 ml
30 kg (~ 10 години)	2 x 22.5 ml (787.5 mg)
20 kg (~ 6 години)	2 x 15 ml (525 mg)
15 kg (~ 4 години)	2 x 10 ml (350 mg)
10 kg (~ 1 до 2 години)	2 x 7.5 ml (262.5 mg)
5 kg (~ 2 месеца)	2 x 3.75 ml (131.25 mg)

Обичайната продължителност на лечението е 7 до 14 дни. Хламидийните инфекции трябва да се лекуват в продължение на 14 дни.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към midecamycin, midecamycin acetate или някое от помощните вещества на лекарствения продукт, тежко чернодробно увреждане.

4.4 Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

По време на продължително лечение трябва да се мониторира активността на чернодробните ензими, особено при пациенти с предпоставяно нарушение на чернодробната функция.

Както при всички antimикробни лекарства, продължителното приложение може да доведе до растеж на резистентни бактерии. Персистиращата диария може да бъде признак на псевдомемброзен колит.



4.5 Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Известно е, че макролидите взаимодействват с други лекарства. Макролидните антибиотици повлияват чернодробния метаболизъм чрез инактивиране на cytochrome P450. За разлика от erythromycin, midecamycin acetate не се свързва с микрозомалните оксидази на чернодробните клетки и не образува стабилни комплекси с cytochrome P450. В резултат на това той не повлиява фармакокинетиката на theophylline.

Midecamycin може да повиши серумните нива на cyclosporine (два пъти по-високи нива), да удължи полуживота и да увеличи AUC (площта под кривата) на carbamazepine. Препоръчва се внимание при пациенти, които приемат едновременно carbamazepine или cyclosporine, като, при възможност, техните серумни нива трябва да се мониторират.

Едновременният прием на midecamycin и ерго-алкалоиди може да доведе до намаляване на чернодробния метаболизъм и повишаване на серумните концентрации на ерго-алкалоидите.

Препоръчва се предпазливост при едновременно приложение на warfarin, тъй като midecamycin може да намали елиминирането му, което увеличава риска от кръвоизлив.

4.6 Бременност и кърмене

Няма съобщения за неблагоприятни ефекти върху плода. Употребата по време на бременност е показана само в случаи, когато потенциалната полза за майката оправдава риска за плода. Лекарството се екскретира в кърмата, поради което майките не трябва да кърмят по време на лечение.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма съобщения за повлияване на способността за шофиране и работа с машини от midecamycin.

4.8 Нежелани реакции

По време на лечение може да се наблюдават леки стомашно-чревни нарушения (намален апетит, стоматит, гадене, повръщане и диария). Диарията много рядко е тежка и персистираща; това може да е признак на псевдомемброзен колит. Възможни са също и алергични реакции (кожен обрив, уртикария, сърбеж, еозинофилия), повишена активност на трансаминазите и жълтеница.

4.9 Предозиране

Няма съобщения за тежка интоксикация. Погълдането на по-голямо количество от лекарството наведнъж може да предизвика предимно гадене и повръщане. Лечението е симптоматично.

5 ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Според АТС класификацията midecamycin - в групата на макролидните антибиотици в J01FA11.

5.1 Фармакодинамични свойства

5.1.1 Антибактериална активност

Midecamycin е широкоспектърен макролиден антибиотик с активност, подобна на активността на erythromycin. Той е активен срещу грам-положителни бактерии (стафилококи, стрептококки, пневмококи, *Bacillus*, *Corynebacterium diphtheriae* и *Listeria monocytogenes*), срещу някои грам-отрицателни бактерии (*Bordetella pertussis*, *Campylobacter* spp., *Moraxella catarrhalis* и *Weissleria* spp.).



анаероби (*Clostridium* spp. и *Bacteroides* spp.) и други бактерии, като микоплазми, уреаплазми, хламиидии и легионели.

Бактериална чувствителност *in vitro* към midecamycin acetate (MDM-acetate)

Бактерия	Средна MIC ₉₀ (μg/ml)	
	MDM-acetate	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	0.5	
<i>Streptococcus pyogenes</i>	0.67	
<i>Streptococcus viridans</i>	0.28	
<i>Staphylococcus aureus</i>	1.5	
<i>Listeria monocytogenes</i>	2	
<i>Bordetella pertussis</i>	0.25	
<i>Legionella pneumophila</i>	0.1	
<i>Moraxella catarrhalis</i>	2	
<i>Helicobacter pylori</i>	0.5	
<i>Propionibacterium acnes</i>	0.12	
<i>Bacteroides fragilis</i>	5.5	
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	0.024	
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	0.34	
<i>Mycoplasma hominis</i>	2.3	
<i>Gardnerella vaginalis</i>	0.08	
<i>Chlamydia trachomatis</i>	0.06	
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	0.5	

Критериите за интерпретацията на MIC на midecamycin според стандартите на NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) са същите, както и за другите макролиди. Бактериите се определят като чувствителни, ако тяхната MIC₉₀ е $\leq 2 \mu\text{g}/\text{ml}$, като резистентни, ако тяхната MIC₉₀ е $\geq 8 \mu\text{g}/\text{ml}$.

5.1.2 Антимикробна ефективност на метаболитите

Метаболитите на midecamycin имат подобен антибактериален спектър като midecamycin, но тяхното действие е малко по-слабо. Резултатите от няколко изследвания върху животни показват, че ефективността на midecamycin acetate е по-добра *in vivo*, отколкото *in vitro*. Това се дължи отчасти на високите концентрации на метаболитите в тъканите.

5.1.3 Механизъм на действие

Midecamycin инхибира РНК-зависимата синтеза на протеините в стадия на удължаване на протеиновата верига. Midecamycin се свързва обратимо с 50S субединицата и блокира реакцията на транспептидиране и/или транслокация. Поради много различната структура на рибозомите, не се наблюдава свързване с рибозомите в еукариотните клетки. Поради тази причина токсичността на макролидите за човешките клетки е ниска.

Както другите макролидни антибиотици, midecamycin оказва предимно бактериостатично действие. Той обаче може да има също и бактерицидно действие, което зависи от вида на бактериите, концентрацията на лекарството на мястото на действие, размера на инокулума и репродуктивния стадий на микроорганизмите. Активността *in vitro* намалява в кисела среда. Ако стойностите на pH в културална среда на *Staphylococcus aureus* или *Streptococcus pyogenes* се повишат от 7.2 до 8.0, MIC на midecamycin е два пъти по-ниска. Ако pH се намали, възника обратната ситуация.

Високите вътреклетъчни концентрации на макролидите се достигат в резултат на добрата им мастна разтворимост. Това е особено важно при лечение на инфекции,



причинени от микроорганизми с вътреклетъчен цикъл на развитие, като хламидия, легионела и листерия. Доказано е, че midecamycin кумулира в алвеоларните макрофаги при човека. Макролидите кумулират също и в неутрофилите. Въпреки че съотношението между екстракелуларните и интрацелуларните концентрации е от 1 до 10 при erythromycin, то е над 10 при по-съвременните макролиди, включително midecamycin. Натрупването на неутрофили на мястото на инфекцията може допълнително да повиши концентрацията на макролидите в инфицираните тъкани. Проучвания *in vitro* показват, че midecamycin повлиява също и имунните функции. Установен е напр. типично поизден хемотаксис в сравнение с erythromycin. Midecamycin вероятно стимулира *in vivo* активността на естествените килърни клетки. Всички тези изследвания показват, че midecamycin повлиява имунната система, което може да е от значение за антибиотичния ефект на midecamycin *in vivo*.

5.1.4 Резистентност

Резистентността към макролидите се развива поради намаления пермеабилитет на външната клетъчна мембра на бактерията (*enterobacteria*), инактивиране на лекарството (*S. aureus*, *E. coli*) и, най-важното, поради промененото място на действие.

В географско отношение, честотата на бактериална резистентност към макролидите варира значително. Резистентността на methicillin-чувствителните *S. aureus* варира от 1% до 50%, докато повечето от methicillin-резистентните щамове на *S. aureus* са резистентни и на макролиди. Резистентността на пневмококите е предимно под 5%, но в някои части на света тя е над 50% (Япония). Резистентността на *Streptococcus pneumoniae* към макролиди варира между 1% и 40% в Европа. Резистентност към микоплазми, легионели и *C. diphtheriae* се развива много рядко.

5.2 Фармакокинетични свойства

5.2.1 Резорбция

Midecamycin acetate бързо и относително добре се резорбира и достига максимални серумни концентрации от 0.5 µg/ml до 2.5 µg/ml и 1.31 µg/ml до 3.3 µg/ml, съответно за 1 до 2 часа. Приемът на храна леко понижава максималните концентрации, особено при деца (от 4- до 16-годишна възраст). Поради това се препоръчва midecamycin да се приема преди хранене.

5.2.2 Разпределение

Midecamycin прониква добре в тъканите, където достига повече от 100% по-високи концентрации, отколкото в кръвта. Той достига високи концентрации в бронхиалните секрети, а също и в кожата. Обемът на разпределение на midecamycin acetate е голям: 228 до 329 литра при здрави доброволци.

47% от midecamycin и 3% до 29% от метаболитите се свързват с протеините. Midecamycin acetate се екскретира и в кърмата при човека. След доза от 1200 mg дневно, 0.4 µg/ml до 1.7 µg/ml от midecamycin acetate се откриват в кърмата.

5.2.3 Метаболизъм и елиминиране

Midecamycin се метаболизира предимно до активни метаболити в черния дроб. Той се екскретира в жълчката и само около 5% в урината.

При пациенти с чернодробна цироза може да се наблюдава значително повишение на максималните серумни концентрации, AUC и полуживота.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Изследвания на острата токсичност, проведени върху мини-живъкове, показват ниска токсичност на midecamycin acetate. Стойностите на LD₅₀ са били над 5000



mg/kg т.т., независимо от начина на приложение, вида, пола и възрастта на животните. Изследванията, проведени с метаболитите на midecamycin (Mb1, Mb2, Mb6 и Mb12), също са показвали ниска токсичност: стойностите на LD₅₀ са били повисоки от 4000 mg/kg т.т. при мишки и над 5000 mg/kg т.т. при пълхове.

Продължителното приложение (5 седмици) на midecamycin acetate на пълхове (в дози до 1000 mg/kg т.т.) и зайци (дози до 400 mg/kg т.т.) не показва специфични токсични ефекти. Аналогично, не са наблюдавани токсични ефекти с метаболитите на midecamycin.

Максималната нетоксична доза на midecamycin acetate (определена след 13 седмици на приложение) е 400 mg/kg т.т. при кучета (1200 mg/kg при мъжките кучета и 400 mg/kg при женските кучета) и 250 mg/kg т.т. при пълхове (след 26 седмици на приложение).

Не са установени тератогенни ефекти на midecamycin при пълхове и зайци. Не са намерени данни за мутагенни и канцерогенни ефекти на лекарственото вещество в литературата.

6 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Гранули за суспенсия за перорално приложение: methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, mannitol, orange colour FCF (E110), anhydrous citric acid, saccharin sodium, hydroxypropyl methylcellulose, anhydrous disodium hydrogen phosphate, banana flavour, silicon emulsion.

6.2 Несъвместимости

Не са известни.

6.3 Срок на годност

3 години.

6.4 Специални предпазни мерки при съхранение

Да се съхранява при температура под 25°C.

Пригответена суспенсия за перорално приложение: Тя е стабилна в продължение на 14 дни, ако се съхранява в хладилник.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6.5 Естество и съдържание на опаковката

Бутилка с алуминиева запушалка, пластмасова мерителна лъжичка: гранули 115 ml за пригответяне на суспенсия за перорално приложение от 175 mg/5 ml, в кутия.

6.6 Указания за употреба и работа с продукта

Пригответяне на суспенсията за перорално приложение

Добавят се 100 ml пречистена вода към гранулите в бутилката и пригответената суспенсия за перорално приложение се разклаща енергично.

Бутилката се разклаща добре преди всяка употреба.

7 ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia





- 8 РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР**
- 9 ДАТА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**
- 10 ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА КХП**
22 октомври, 2004 г.

