

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Име на лекарствения продукт.

БЯЛ РАВНЕЦ СТРЪК
MILLEFOLII HERBA

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към
разрешение за употреба № 11-5640/12.07.02.

N=3/29.04.02

Ефим

2. Количествен и качествен състав.

Състои се от изсушените, раздробени стръкове на Achillea millefolium L. в опаковки по 50g, 70g или 100g.

3. Лекарствена форма

Лечебно растение. Herbal drug.

4. Клинични данни

4.1. Показания

Вътрешно: Употребява се като помошно средство при: безапетитие, диспептични оплаквания, при маточни кръвоизливи.

Външно: за седящи бани при хемороиди.

4.2. Дозировка и начин на приложение.

Две супени лъжици стръкове бял равнец се заливат с 400 мл кипяща вода (100°C). Вари се 3 минути. Престоява при стайна температура (15° - 20°C) 30 минути и се прецежда. Долива се с вода до първоначалния обем (400 мл).

Вътрешно - водният извлек се приема по 100 мл три пъти дневно преди ядене.

Възрастова схема: За болни

над 25 год.	1 доза	100 мл
от 14 год. до 25 год.	$\frac{2}{3}$ доза	67 мл
от 7 год. до 14 год.	$\frac{1}{2}$ доза	50 мл
от 4 год. до 7 год.	$\frac{1}{3}$ доза	33 мл

За седящи бани - 50 g стръкове бял равнец се заливат с 10 л кипяща вода (100°C). Вари се 5 минути.

Външно - седящи бани се правят 1-2 пъти на ден.

Трайността на извлека е 12 часа, което налага той да се приготвя ежедневно. Приготвеният извлек се съхранява при температура 2° - 8°C в хладилник без да замръзва.



4.3. Противопоказания.

Свръхчувствителност (алергия) към Бял равнец и други растения от семейство Сложноцветни.

4.4 Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба.

Приложението при маточни кръвоизливи изисква консултация с лекар.

4.4. Продължителност на лечението.

Лечението при безапетитие, диспептични оплаквания продължава 3 месеца. След почивка от 15 дни курсът на лечение може да се повтори.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия.

Няма.

4.6. Бременност и кърмене.

Само под лекарски контрол.

4.7. Ефекти върху способността на шофиране и работа с машини.

Няма.

4.8. Нежелани лекарствени реакции.

Възможна е поява на свръхчувствителност.

4.9. Информация при предозиране.

Появяват се симптоми на интоксикация - гадене, повдигане, горчив вкус в устата, тежест в стомаха, понякога диария. Силно тилно главоболие, отпадналост. Типични за отравяне са кожните обриви, появяващи се още в първите часове.

5. Фармакологични данни.

5.1. Фармакодинамични свойства - механизъм на действие.

Няма данни.

5.2. Фармакокинетични свойства.

Няма данни.

5.3. Предклинични данни за безопасност.

Няма.

6. Фармацевтични данни.

6.1. Списък на помощните вещества и техните количества.

Няма.

6.2. Физико-химични несъвместимости.

Няма

6.3. Срок на годност

- в опаковка от 50g, 70g или 100g - 24 месеца

- след приготвяне на водния извлека се съхранява при температура (2° - 8°C) 12 часа.

6.4. Специални условия за съхранение.

При стайна температура (под 25°C) в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева светлина помещения.

6.5. Данни за опаковката.

Хартиен плик.



7. Име и адрес на притежателя на разрешението.

ЕТ "БИЛЕК", гр. Троян, ул. "Бенковски" 1

8. Регистрационен №.

9. Дата на първо разрешаване за употреба.

10. Дата на (частична) актуализация на текста.

24 юни 2002 г.

