

BEN-GAY PAIN RELIEVING RUB™

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Име на продукта

Ben-Gay Pain Relieving Rub.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНТО

Приложение към
разрешение за употреба № К-4808 | 06.02.02.

616/18.12.01

Rey

2. Количество и качествен състав

Един грам унгвент съдържа methyl salicylate 150mg и menthol 100mg.

3. Лекарствена форма

Унгвент

4. Клинични данни

4.1 Показания

За симптоматично локално облекчаване на болката и възпалението при артрактура, миалгия и разтягане.

4.2 Дозировка начин на приложение

Унгвентът се прилага чрез втряване върху кожата на засегнатата област. Това може да бъде повторено при необходимост след няколко часа (3-4 пъти на ден).

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към methyl salicylate, menthol или някои от другите съставки, отворени рани, възпалена кожа, деца под 12 години.

4.4 Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

Само за външно приложение.

Не използвайте със загряващи компреси.

Не използвайте при появя на възпаление на кожата.

Да се избягва попадането в очите и върху лигавици

В случай, че болката продължи 10 или повече дни без да има облекчаване на симптомите, трябва да се потърси консултация с лекар.

4.5 Взаимодействия с други медикаменти и други форми на взаимодействия

Няма

4.6 Бременност и кърмене

Поради факта, че salicylate се абсорбира през кожата и може да предизвика прояви на повишена възбудимост на централна нервна система, особено след приложение върху обширни територии, Ben-Gay Pain Relieving Rub може да се прилага при бременност само след внимателна преценка на съотношението полза/рисък.



4.7 Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Ментол

Ментол рядко може да предизвика алергични реакции като уртикария, еритема и други кожни лезии. На практика обаче, броят на нежеланите лекарствени реакции след външно приложение на ментол е много нисък.

Метилсалицилат

Независимо от доказателствата, че погъщането на метилсалицилат е опасно, след външно приложение така, както е препоръчано, метилсалицилат се понася добре с изключение на редки случаи в които възниква силно локално дразнене.

4.9 Предозиране

При локално приложение няма опасност за предозиране.

Поради кожната абсорбция на ментола след приложение му върху обширни площи, могат да възникнат нежелани лекарствени реакции, подобни на тези при ексцесивна употреба на други лекарства, съдържащи ментол: гадене, абдоминална болка, повръщане, и симптоми на потискане на централна нервна система (замайване, нестабилна походка, сънливост, брадипнея и кома).

5.0 Фармакологични данни

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: лекарство за локално приложение при артралгия и миалгия. ATC код: M02A C

Ментолът е намаляващо болката средство (локален вазодилататор)

При локално приложение на ментол се наблюдава бързо и персистиращо чувство на затопляне.

Метилсалицилатът действа като намаляващо болката средство, което се използва за временно облекчаване на “дълбоко разположена” болка.

В двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване е установено, че успокояващият болката лосион, съдържащ метилсалицилат, при хора, страдащи от средноизразен по болезненост артрит е проявил значително по-голям ефект от този на плацебо, при облекчаване на артритната болка.

Приложението на локално действащия крем, съдържащ метилсалицилат върху болезнени артритно променени стави при тест- групата доведе до значително намаление на акционния потенциал на разположените в съседство мускули, докато приложението на плацебо не предизвика значими промени.

Действието на Ben-Gay Pain Relieving Rub за намаляването на мускулния спазъм и болката при мускулен спазъм, е свързано с процеса на затопляне, предизвикан от дилатацията на капилярите, увеличения приток на кръв и отстраняването на млечната киселина.

Проучване разкри, че Ben-Gay Pain Relieving Rub води до леко, но значимо удължаване на времето за тичане с темпо под максималното, намалява субективното чувство за болка Збч след равновесно монотонно бягане.



намалява субективното чувство за дискомфорт в последните минути на максимално монотонно бягане.

5.2 Фармакокинетични данни

След локално приложение метилсалицилат се абсорбира през неувредена кожа. Перкутанско абсорбираният метилсалицилат има системни ефекти, абсорбираното количество е достатъчно да предизвика значителен аналгетичен ефект.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Няма налични предклинични данни за безопасност.

6. Фармацевтични данни

6.1 Списък на неактивните съставки

Stearic acid, glycerylmonostearate, anhydrous lanoline, polysorbate 85, sorbitan tristearate, trietanolamine, purified water

6.2 Несъвместимости

Неприложимо

6.3 Срок на годност

3 години. Срокът на годност не се променя след отваряне на тубата.

6.4 Съхранение

Да се съхранява при температура под 30⁰ C

6.5 Естество и състав на опаковката

Туби от 35г

Да се съхранява на недостъпно за деца място.

6.6 Инструкции за употреба

Неприложими

7. Притежател на разрешителното за употреба

PFIZER H.C.P.

235 East 42nd Street

New York, NY100017-5755

USA

8. Номер на разрешителното за употреба

9. Дата на първо разрешително за продажба/на подновено разрешително за продажба

05.10.1993

10. Дата на последна редакция на текста

Август 2000

