

Inbiotech Ltd
Bulgaria

Biozac caps.hard 10 mg

стр.1/10

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ**



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ (SPC)
BIOZAC капсули твърди 10 mg

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

BIOZAC capsules hard 10 mg
БИОЗАК капсули твърди 10 mg

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към
разрешение за употреба № 11-3545 | 18.05.04.

607/24.04.01

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка капсула твърда съдържа лекарствено вещество Fluoxetine hydrochloride - 11.18 mg, еквивалентно на Fluoxetine 10 mg

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капсули твърди.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1. Терапевтични показания


- Депресия.* Показан е за лечение на депресивни симптоми с или без наличие на тревожност и в случаите, когато не се изисква седативен ефект;
- Обсесивно - компултивни разстройства;*
- Булиния нервоза.* Биозак е показан за намаляване на пристъпите на булиния и потискане на самопредизвиканото повръщане.

4.2. Дозировка и начин на приложение

Биозак капсули се приемат перорално, преди или след хранене.

Депресия. При възрастни и пациенти в старческа възраст се препоръчва доза 20 mg дневно. Като правило тази доза е достатъчна за получаване на терапевтичен ефект. Настъпването на антидепресивния ефект може да се очаква след дву- седмичен латентен период. При липса на задоволителен терапевтичен ефект дневната доза може да бъде повишена на 40-60 mg, като се разделя на 2 приема - сутрин и вечер. Повишаването на дозата трябва да става постепенно. Поради удължаване времето на полуелимириране при пациенти в старческа възраст, с чернодробни и бъбречни заболявания, дозата трябва да бъде по-ниска, а интервалите на приема да са удължени.

Обсесивно - компултивни разстройства Препоръчва се от 20 до 60 mg дневно на възрастни пациенти, като началната доза трябва да бъде 120 mg дневно. Повишаването на дозата трябва да става постепенно в продължение на няколко седмици.



Булимия нервоза. За възрастни и пациенти в старческа възраст се препоръчва доза 60 mg дневно. При многократно приложение трябва да се има предвид, че поради удълженото време на полуелиминиране на флуоксетина след спирането на лечението, плазмените му концентрации могат да се запазят в продължение на няколко седмици.

Деца - Безопасността на Биозак не е проучена при тази категория пациенти. Не се препоръчва употребата му при деца. Продължителност на лечението - за лечение на остри епизоди е необходимо приложение на препарата в продължение на 4-8 седмици.

4.3. Противопоказания

- Свръхчувствителност към флуоксетин;
- Тежка бъбречна недостатъчност (реналният клиранс <10 ml/min);
- По време на кърмене;
- Едновременно прилагане с МАО-инхибитори (необходим интервал не по-малък от 14 дни).

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки

В началото на лечение с флуоксетин е възможно засилване на някои симптоми, като инсомния, тревожност, което изисква коригиране на дозировката на препарата.

С внимание флуоксетин трябва да се прилага при пациенти с булимия нервоза със значителни промени в телесното тегло.

Поради опасност от засилване на манийните или хипоманийните състояния, приложението на флуоксетин при пациенти с подобни прояви изисква необходимото внимание.

Внимателно и при непрекъснато наблюдение флуоксетин може да се прилага при пациенти с анамнестични данни за гърчове. При болни с епилепсия препаратът може да се прилага само в случаите на успешен контрол на гърчовете.

Флуоксетин има удължено време на полуелиминиране. Това изисква внимателно уточняване на дозировките при пациенти със съпътстващи заболявания - чернодробни, бъбречни.

При пациенти с диабет може да се наложи коригиране на дозите на антидиабетичните средства, поради нарушения в глюкозния контрол при прием на флуоксетин.

При поява на кожни обриви или други прояви на свръхчувствителност към флуоксетин, лечението трябва да бъде прекратено.

Внимателно приложение се изисква и при пациенти със сърдечни заболявания, тъй като няма достатъчно клиничен опит в това отношение.



4.5. Лекарствени и други форми на взаимодействия

Флуоксетин се метаболизира от цитохром P450 изоензим P4502D6 и в това отношение може да взаимодейства с други лекарствени вещества на ниво лекарствен метаболизъм.

Плазмените концентрации на антиконвулсивните средства - фенитоин, (Дифенин), карбамазепин (Тагретол) могат да се повишат при едновременно приложение с флуоксетин.

Плазмените концентрации на антипсихотичните средства - халоперидол и клозапин е възможно да се повишат при едновременно приложение с флуоксетин, което би могло да представлява рисък за поява на сериозни нежелани реакции.

Времето на полуелиминиране на диазепам, и алпразолам се удължава при едновременна употреба с флуоксетин. Това създава предпоставка за предизвикване на нежелани реакции и токсични ефекти.

При лечение с литиеви соли на болни, получаващи флуоксетин се наблюдавани случай, както на увеличаване така и на намаляване на нивата на лития в плазмата. Освен това в литературата се съобщават случаи на тосичност с литиеви препарати при едновременно използване на лекарствени продукти със серотонинергично действие. Това налага прилагането на литиеви препарати да бъде монитирано.

Болни, лекувани с флуоксетин и триптофан са показвали странични реакции като ажитация, неспокойство и стомашно чревен дискомфорт.

При прилагане на трициклични антидепресанти (дезипрамин, имипрамин), дозата им трябва да бъде намалена и техните плазмени нива трябва да бъдат монитирани, ако започне лечение с флуоксетин или лечението му се прекъсва.

При прилагането на МАО-инхибитори и флуоксетин, интервалът между тях не трябва да бъде по-малък от 14 дни, тъй като могат да се наблюдават сериозни нежелани реакции.

Флуоксетин се свързва до 95 % с плазмените протеини. Това създава възможност за взаимодействие на флуоксетин с други лекарствени вещества, притежаващи висок афинитет към плазмените протеини.

Антикоагулантите от кумариновата група се конкурират с флуоксетина за плазмените протеини и в някои случаи, известени от връзката им с плазмените протеини могат да доведат до нежелани лекарствени реакции, като напр. кървене.

Дигиталисовите глюкозиди (напр. дигитоксин, догоксин) също така могат да бъдат извествани от връзката им с плазмените протеини от флуоксетина и тъй като те действат в много малки доза могат да доведат до брадикардия, нарушаване на антриовентрикуларното провеждане, смущения в сърдечния ритъм.

Всички лекарствени вещества, които се метаболизират от P4502D6 системата и които имат тесен терапевтичен индекс би трябвало да се прилагат в малки дози в началния период на болни, лекувани с флуоксетин или които са били лекувани с флуоксетин през последните пет седмици. Такива лекарствени вещества са флексамид, винблатин, трицикличните антидепресанти.

Флуоксетин, макар и по-слабо може да бъде метаболизиран от P4503A4. Така напр. проучвания *in vitro* показват, че кетоконазол (мощен инхибитор на P4503A4) е около сто пъти по-мощен субстрат на ензима в сравнение с флуоксети и норфлуоксетин.

Едновременното прилагане на флуоксетин в единични дози заедно с терфенадин (специфичен субстрат на цитохром P4503A4) не води до увеличаване на плазменото ниво терфенадина.

4.6. Бременност и кърмене

Въпреки, че няма данни за ембриотоксични и тератогенни ефекти на флуоксетин, неговото използване при бременно може да става само при сериозни медицински показания за това. Флуоксетин се екскретира в значителни концентрации в кърмата. Поради опасност от увреждане на кърмачето не се препоръчва прием на препарата по време на кърмене.

4.7. Влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Флуоксетин, както и други антидепресивни средства може да наруши способността за концентрация, рефлексите и активното внимание. Препоръчва се с изключително внимание да се употребява при пациенти - водачи на моторни превозни средства и тези, които работят с машини.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Флуоксетин се различава от трицикличните антидепресанти с по-добра поносимост и по-малка честота на нежеланите действия.

Проявените в началото на терапията с препарата нежелани лекарствени реакции, обикновено отслабват в процеса на лечението.

Общи реакции – Често: астения; Рядко: треска, изпотяване, вазодилатация, студени тръпки. Реакциите на свръхчувствителност могат да се проявят като сърбеж, кожни обриви, уртикария, васкулити, анафилактоидни реакции, фоточувствителност; Изключително рядко: злокачествен ^{на} невроендокринен синдром.



Сърдечно-съдова система - *Често:* хеморагия, хипертония; *Рядко:* ангина пекторис, стенокардни пристъпи, тахикардия, мигрена, синкоп, аритмия. *Изключително рядко:* AV – блок I ст., брадикардия, съдово главоболие, тромбофлебит, камерна аритмия, камерни екстрасистули, тромбофлебит, вентрикуларна аритмия.

Храносмилателна система - *Често:* повишен апетит, гадене, повръщане; *Рядко:* афтозен стоматит, холелитиаза, колит, диария, хълцане, гастрит, гастроентерит, глосит, кървене на венците, хиперхлорхидрия, повишена саливация, мелена, улцерации по лигавицата на устата; *Изключително рядко:* болки в областта на черния дроб, дуоденална язва, мастна дегенерация на черния дроб, хепарит.

Централна нервна система – *Често:* ажитация, амнезия, конфузни състояния, емоционална лабилност; *Рядко:* нарушения на мозъчната дейност, акатизия, апатия, атаксия, смущения в говора, депресия, деперсонализация, параноидни реакции, маниакална реакция, вертиго, хиперкинезия, повишен мускулен тонус, миоклонус. *Изключително рядко:* абнормна електроенцефалограма, екстрапирамидни нарушения, ступор, миоклонус, тортиколис, кома.

Кожа и кожни придатъци – *Рядко:* алопеция, акне, контактен дерматит, суха кожа, херпес симплекс, макулопапулозен обрив и уртикария, екзема. *Изключително рядко:* еритема мултиформе, гъбичен дерматит, пустулозен обрив, себорея, везикулозен обрив.

Дихателна система – *Рядко:* астма, епистаксис, хълцане *Изключително рядко:* апнея, подтискане на кашлицата, хипоксия, едема на ларингса

Ендокринна система: *Рядко:* хипотиреоидизъм, диабетна кетоацидоза, захарен диабет

Метаболитни нарушения - *Често:* намаляване на телесното тегло; *Рядко:* дехидратация, генерализиран оток, хиперхолестерolemия, хипокалиемия. *Изключително рядко:* Повишаване на алкалната фосфатаза и креатифосфокиназата.

Хемопоеза – *Рядко:* анемия, екхимоза; *Изключително рядко:* анемия, левкопения, лимфоцитоза, лимфедем.



Урогенитална система – Често: често уриниране; Рядко: аборт, албуминурия, цистит, уретрит, промени в либидото, импотентност, болки в гърдите, лактация аменорея; Изключително рядко: олигурия хематурия, вагинит, епидидимит, метрорагия, болки в бъбреците, приапизъм.

Мускулно-скелетната система – Рядко: болки в гръбначния стълб, артралгии, мускулни болки, артрит, костна болка, бурсит, теносиновит. Изключително рядко: артроза, хондродистрофия, миастения, миопатия, миозит, остеопороза.

Сетивни органи - Често: болки в ушите, промяна на вкусовите усещания, тинит; Рядко: конюнктивит, сухота в очите, мидриаза, фотофобия; Изключително рядко: блефарит, диплопия, екзофталм, кръвоизливи в очите, глаукома, ирит, склерит, страбизъм

Физическо и психическо пристрастване към флуоксетин

Не са извършвани системни изследвания за повлияването от флуоксетин на психическата и физическа насоченост. Предварителните клинични наблюдения при приемане на флуоксетин не дават данни за тенденция на поява на синдром на отнемане при неговото спиране. Също така няма наблюдения за насочено търсене на флуоксетин при пациенти които са били лекувани с него или са го приемали по друг повод. Въпреки това лекарите внимателно трябва да наблюдават болни, които се лекуват с флуоксетин и които имат данни за пристрастване.

4.9. Предозиране

Случаите на предозиране и особено завършилите фатално са много редки. Като правило, те протичат леко с пълно възстановяване. Съобщава се за наблюдаван болен приел 3000 mg флуоксетин и получил два припадъка тип гранд мал, кото са отзукали спонтанно. Симптомите на предозиране са: гадене, повръщане, психомоторна възбуда, ажитация, хипомания и други белези на възбуждане на ЦНС.

Лечение на свръхдозиране: Специфичен антидот няма. Лечението се провежда симптоматично. Пациентите приели по-висока доза флуоксетин трябва да бъдат наблюдавани по-продължително време. Провеждат се мерки за поддържане на жизнено важни центрове и използването на медикаменти за повлияване на съответните симптоми. Ако пациентите са приемали трициклични антидепресанти, е възможна появата на токсични симптоми. Освен това активен въглен или сорбитол също могат да бъдат ефективни при неспецифично лечение.



Поради големия обем на разпределение на флуоксетин в организма усилената диуреза, диализата и хемоперфузията нямат съществено значение при лечение на предозирането.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ

5.1. Фармакодинамични свойства

ATC-код. Антидепресанти - специфични инхибитори на обратното залавяне на серотонина.

Флуоксетин представлява рацемична смес от R и S изомери в съотношение 50/50. И двата изомера притежават специфично действие върху обратното залавяне на серотонина. S изомерът се елиминира по-бавно и присъства по-дълго време в плазмата. Флуоксетин притежава изразени антидепресивни, антикомпulsивни и антибулимични свойства. Основният механизъм на неговото действие е свързан със способността да инхибира обратното залавяне на серотонина в пресинаптичната част на серотонинергичните нервни окончания в ЦНС.

Серотонинергичните рецептори са представени предимно в лимбичната система и някои подкорови структури. Изследванията през последните години показват, че свързването с тях на ендогения серотонин или на лекарства със същите серотонин подобни структури играе важна роля за протичането на емоционалните психични процеси.

Той се различава от трицикличните антидепресанти със слабия афинитет към мускаринови, хистаминови и α_2 -адренергични рецептори. С това се обяснява и по-добрата поносимост и липсата на кардиотоксични ефекти. Основният метаболит на флуоксетина - S норфлуоксетин притежава значително изразена активност по отношение на инхибирането на обратното залавяне на серотонина, което обуславя основните фармакологични свойства на флуоксетин.

5.2. Фармакокинетични свойства - резорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция

Флуоксетин притежава бърза и пълна резорбция при перорално приложение. Пик на плазмените концентрации се наблюдава на 6-8 час след приема на еднократна доза от 40 mg, като стойностите им варират от 15 до 55 $\mu\text{g}/\text{ml}$. Храната не оказва съществено влияние върху резорбцията и времето на достигане на пиковите стойности. При концентрации на флуоксетин от 200-1000 $\mu\text{g}/\text{ml}$, приблизително в 95 % се свързва с плазмените протеини *in vitro* (албумини и α_1 -гликопротеин). Този факт предполага възможност за значителни взаимодействия на флуоксетин с други лекарства, притежаващи висок афинитет към протеини. Флуоксетин интензивно се метаболизира в

черния дроб, като чрез деметилиране се образува основния му метаболит норфлуоксетин и редица други неактивни метаболити. S норфлуоксетин - изомер е 14 пъти фармакологично по-активен от другия му изомер R норфлуоксетин. Метаболизът на флуоксетина значително зависи от цитохром P4502D6 изоензима. При приблизително 7 % от индивидите активността на тази система може да бъде значително понижена. Тези факти дават основание да бъдат обяснени наблюдаваните в клиниката големи индивидуални вариации в метаболизма на препарата. От друга страна, способността на флуоксетин да инхибира изоензим P4502D6, обуславя възможните взаимодействия с голям брой лекарства. Флуоксетин се характеризира със забавено елиминиране. След прием на еднократна доза времето за полуелимириране е приблизително 1-3 дни и до 4-6 дни след многократното му приложение. Това създава възможност за кумулиране на препарата. Времето на полуелимириране на основния му метаболит - норфлуоксетин варира между 4-16 дни след еднократно и многократно приложение на препарата. Времето на полуелимириране значително се удължава при пациенти с чернодробни и бъбречни заболявания, а също така и при пациенти в старческа възраст. Поради удълженото време на полуелимириране на флуоксетин и норфлуоксетин, те могат да персистират в организма седмици след преустановяване на лечението, което може да има важно клинично значение, както по отношение на терапевтичния му ефект, така и за появя на нежелани реакции. Основната част на препарата (до 80 %) се елиминира с урината и до 15 % с фекалиите.

5.3. Предклинични данни за безопасност

- *Токсичност.* Флуоксетин се отнася към фармакологично-активните вещества с ниска токсичност. Продължително третиране на експериментални животни с дози, многократно превишаващи терапевтичните, не предизвиква поведенчески, клинични, хематологични, биохимични, макроскопски и хистологични промени.
- *Канцерогенност.* Въвеждането на флуоксетин в продължение на 2 години в дози 10 - 20 mg/kg тегло на мишки и плъхове не показва различие в развитието на тумори в контролни и опитни групи.
- *Мутагенност.* Няма данни за генотоксичност на флуоксетин или неговия метаболит норфлуоксетин при изпитване на *in vitro* и *in vivo* модели.



- *Тератогенност, ембриотоксичност и влияние върху фертилитета.*
Не са установени ембриотоксични и тератогенни ефекти на флуоксетина при изпитване върху плъхове и зайци в дози от 12,5 до 15 mg/kg тегло. Флуоксетин не оказва влияние върху фертилитета при проучване върху плъхове в дози от 7,5 до 12,5 mg/kg тегло.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1. Помощни вещества

Cellulose microcrystalline	- 17.50 mg
Magnesium stearate	- 1.00 mg
Lactose monohydrate	- 40.32 mg

6.2. Физико - химични несъвместимости

Няма данни за физико - химични несъвместимости.

6.3. Срок на годност

3 (три) години.

6.4. Съхранение

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25° C.

6.5. Опаковка

Блистери от PVC алуминиево фолио по 7 броя твърди желатинови капсули.

По два и четири блистера в една опаковка.

20 бр. твърди желатинови капсули в тъмни стъклени банки.

6.6. Производител и притежател на разрешението

Inbiotech ООД, България

София 1000, ул."Триадица" № 5а

Тел. (02) 987-95-37;

Факс (02) 988-04-57

