

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение №2 към

Решение № 11-496/110.04.97

546/26.03.1996г.

*Димитров*

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА



## **BUSCOPAN супозитории**

### **Състав:**

**1 супозиторий за Възрастни съдържа N-бутилскополамин бромид 10 mg и помощни вещества: твърдо масло, Вода**

### **Свойства**

Изразено спазмолитично действие с възможност да купира хипермотилитета и пилороспазъма. Премахва позивите за повръщане и спастичната констипация. Спазмолитичното му действие обхваща както гастроинтестиналния тракт, така също и чернодробните и пикочни пътища. Оказва ефект и върху долния маточен сегмент.

### **Фармакокинетика**

Buscopan блокира действието на ацетилхолина върху рецепторите на постсинаптичните мембрани и на гладката мускулатура. По този начин премахва дразненето на стомашно-чревния тракт, жълчните колики, спазмите в областта на пикочните пътища и женските гениталии. Въз основа на това си действие той премахва дискинезиите на жълчните пътища и дисменореята.

### **Показания**

Стомашна и дуоденална язва, стомашно-чревни спазми и хипермотилитет, повръщане в следоперативния период, спастична констипация, жълчна дискинезия, спазми в отводящите пикочни пътища, забавена релаксация на долния утеринен сегмент, дисменорея. Buscopan облекчава ендоскопското изследване на гастро-интестиналния тракт и е полезен при подготовката за рентгенова и ултразвукова диагностика.

### **Противопоказания**

Парентералното приложение на Buscopan е противопоказано при глаукома, хипертрофия на простатата със задръжка на урина, механични стенози в областта на гастроинтестиналния тракт, тахиаритмия, миастения гравис, мегаколон.

Инжектиране на Buscopan не се назначава при болни със свръхчувствителност към хидрооксибензоена киселина.

### **Предпазни мерки**

При лечение с Buscopan значително по-малко са изявени характерните за атропин антихолинергични прояви от страна на сърдечно-съдовата система, акомодацията и слюнчените жлези. При орално или ректално приложение в терапевтични дози не се наблюдават антихолинергични странични явления.

### **Бременност**

Buscopan се прилага само при строги индикации и при лекарско наблюдение.

#### **Странични действия**

При лечение с Buscopan се постъпка потната и слюнчена секреция. Наблюдавани са смущения в уринирането, тахикардия. При отделни болни се получават реакции на свръхчувствителност като уртикария. При парентерално приложение са възможни смущения в акомодацията. Рядко настъпва понижаване на кръвното налягане по време на парентерално приложение. Само при единични случаи са възможни по-тежки реакции на свръхчувствителност до изразено шоково състояние. Могат да бъдат засегнати и възможностите за съобразяване и реакции.

#### **Взаимодействия**

Антихолинергичното действие на Buscopan се усилва от амантидин, хинидин, трициклични антидепресанти, антихистаминови препарати, гизопирамид. Възможно е да се засили тахикардията при едновременното прилагане на бета-симпатикомиметик. Едновременното назначаване на допамин антагонисти напр. метоклопрамид може да причини противоречиво отслабващо действие върху моталитета на стомашно-чревния тракт.

При едновременно приемане на сънотворни и противоепилептични средства /фенобарбитал, глутетимиid, фенитион/, както и рифампицин може да се получи ензимна индукция, при която с малка доза парацетамол да се стигне до чернодробно увреждане. Същото важи и за приемане на алкохол. При забавено изпразване на стомаха, напр. при пропантелин е възможно да не се осъществи резорбцията на парацетамола. При комбинирането с хлорамфеникол се увеличава времето на полуживот и се повишава неговата токсичност.

#### **Дозировка и приложение**



Възрастни и деца в училищна възраст - 3-5 дневно по 1-2 супозитории.

#### **Съхранение**

Съхранява се на сухо и хладно място, до 25°C, на място недостъпно за деца

#### **Опаковка**

супозитории 6



Гръблен

П. Додел