

Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство:

Traumeel S
Траумил С

2. Качествен и количествен състав:

1 ампула от 2,2 мл. (=2,2г.) съдържа:

Лекарствени вещества:

| | | |
|-----------------------|----|---------|
| Arnica montana | D2 | 2,2 mg |
| Calendula officinalis | D2 | 2,2 mg |
| Chamomilla recutita | D3 | 2,2 mg |
| Symphytum officinale | D6 | 2,2 mg |
| Achillea millefolium | D3 | 2,2 mg |
| Atropa belladonna | D2 | 2,2 mg |
| Aconitum napellus | D2 | 1,32 mg |
| Bellis perennis | D2 | 1,1 mg |
| Hypericum perforatum | D2 | 0,66 mg |
| Echinacea | D2 | 0,55 mg |
| Echinacea purpurea | D2 | 0,55 mg |
| Hamamelis virginiana | D1 | 0,22 mg |
| Mercurius solubilis | D6 | 1,1 mg |
| Hahnemanni | | |
| Hepar sulfuris | D6 | 2,2 mg |

3. Лекарствена форма:

перорална ампула, разтвор

4. Клинични данни


4.1. Показания:

Наранявания от всякакъв вид /при спортуване, злополука/ като навяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи, ставни изливи, счупвания на костите и т.н., възпалителни и свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи и тъкани /напр. пародонтити, гнойни венечни джобове, парадонтози/, както и на опорния и двигателния апарат /тендовагинит, бурсит, хумероскапуларен периартрит/, артроза на бедрените, коленните и малките стави.

4.2. Дозировка и начин на приложение:

Обикновено 1 ампула се разтваря във вода и се изпива преди хранене 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1-3 ампули дневно.

При деца до 12 год. възраст продуктът да се прилага след лекарска препоръка.



4.3. Противопоказания:

Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки или свръхчувствителност към растенията от сем. Сложноцветни.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Ако след приложението на продукта не настъпи подобрение или състоянието се влоши, да се преоцени лечението. По принцип, поради възможна имунологична реакция след приемане на Echinacea, да се избягва при прогресиращи системни заболявания като туберкулоза, левкоцитоза, колагенни васкуларни заболявания, МС, HIV инфекции, СПИН и други аутоимунни заболявания. Да не се инжектира!

4.5. Лекарствени взаимодействия:

Не са известни

4.6. Бременност и кърмене:

При бременни и кърмачки лекарството може да се прилага само след оценка на съотношението полза/риск от лекар.

4.7. Продуктът не е противопоказан при шофьори.

4.8. Нежелани реакции:

При единични случаи може да има реакции на свръхчувствителност. След употреба може да се засили слюноотделянето. В такива случаи се консултирайте със специалист.

4.9. Предозиране:

Няма

5. Фармакологични данни

5.1. Хомеопатичен лекарствен продукт

6. Фармацевтични данни:

6.1. Помощни вещества:

| | |
|----------------------|------------|
| Water for injections | 2179,10 mg |
| Sodium chloride | 19,4 mg |

6.2. Съхранение:

Продуктът да се съхранява при температура под 25° на защитено от светлина място.

Срок на годност: 5 години

Продуктът да се съхранява на недостъпно за деца място!

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!



6.3. Данни за опаковката:

Картонена кутия, съдържаща 10 ампули от 2,2 мл.

7. Име и адрес на производителя и притежател на решението за употреба:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden

8. Регистрационен номер

9. Дата на първо разрешаване за употреба

