

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

1. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

VFEND 40 mg/ml powder for oral suspension
ВИФЕНД 40 mg/ml прах за перорална суспенсия

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приложение към И-12804/11-04-06
разрешение за употреба №

693/28.03.06

М. Симеонов

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка бутилка съдържа 45 g прах за перорална суспенсия, от който след разтваряне във вода се получават 40 mg/ml voriconazole.

За помощните вещества вижте раздел 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за перорална суспенсия с бял до белезниково-бял цвят, от който след разтваряне се получава бяла до белезниково-бяла суспенсия с вкус на портокал.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1. Терапевтични показания

VFEND, voriconazole, е широкоспектърен триазолов антимикотичен агент и е показан за:
Лечение на инвазивна аспергилоза.

Лечение на кандидемия при пациенти без неутропения.

Лечение на флуконазол-резистентни сериозни инвазивни *Candida* инфекции (включително с *C. krusei*).

Лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от *Scedosporium* spp. и *Fusarium* spp.

VFEND трябва да бъде прилаган главно при пациенти с прогресиращи, потенциално животозастрашаващи инфекции.

4.2. Дозировка и начин на приложение

VFEND перорална суспензия трябва да се прилага най-малко един час преди или два часа след хранене.

Електролитни нарушения като хипокалиемия, хипомагнезиемия и хипокалциемия трябва да бъдат мониторирани и при нужда коригирани преди започване и по време на лечение с voriconazole (вижте раздел 4.4).

VFEND се предлага в една от следните лекарствени форми: филмирани таблетки от 50 mg и 200 mg, 200 mg прах за инжекции.

Употреба при възрастни

Лечението трябва да бъде започнато с посочения насищащ дозов режим интравенозен или перорален VFEND, целящ достигане през първия ден на плазмени концентрации, близки до равновесните. Предвид високата бионаличност при перорален прием (96%, вж. раздел 5.2) при съответни клинични показания е уместно преминаване от интравенозно към перорално приложение.

Следващата таблица предлага детайлна информация за препоръчителните дози:

	Интравенозно	Перорална суспенсия	
		Пациенти с телесно тегло 40 или повече	Пациенти с телесно тегло под 40 kg



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

		kg	
<u>Насищащ дозов режим (първите 24 часа)</u>	6 mg/kg на всеки 12 часа (за първите 24 часа)	400 mg (10 ml) на всеки 12 часа (за първите 24 часа)	200 mg (5 ml) на всеки 12 часа (за първите 24 часа)
<u>Поддържаща доза (след първите 24 часа)</u>	4 mg/kg два пъти дневно	200 mg (5 ml) два пъти дневно	100 mg (2.5 ml) два пъти дневно

Коригиране на дозировката

При недостатъчен клиничен отговор поддържащата доза може да бъде увеличена до 300 mg два пъти дневно за перорално приложение. При пациенти с телесно тегло под 40 kg пероралната доза може да бъде увеличена до 150 mg два пъти дневно.

При неспособност на пациента да толерира лечение с такива високи дози пероралната доза се намалява стъпаловидно с 50 mg до поддържащата доза от 200 mg два пъти дневно (или 100 mg два пъти дневно при пациенти с телесно тегло под 40 kg).

Phenytoin може да бъде приложен едновременно с voriconazole, но поддържащата перорална доза voriconazole трябва да се увеличи от 200 mg на 400 mg два пъти дневно (от 100 mg на 200 mg два пъти дневно при пациенти с телесно тегло под 40 mg), вж. раздели 4.4 и 4.5.

Rifabutin може да бъде приложен едновременно с voriconazole , ако поддържащата перорална доза voriconazole е увеличена от 200 mg на 350 mg два пъти дневно (от 100 mg на 200 mg перорално два пъти дневно при пациенти с телесно тегло под 40 mg), (вж. раздели 4.4 и 4.5).

Продължителността на лечението зависи от клиничния и микологичен отговор при пациента.

Употреба при напреднала възраст

При пациенти в напреднала възраст не е необходима корекция на дозата (вж. раздел 5.2).

Употреба при пациенти с бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на перорално приложения voriconazole не се повлиява при бъбречно увреждане.

Следователно при пациенти с леко до тежко бъбречно увреждане не е необходима корекция на пероралната дозировка (вж. раздел 5.2).

Клирънсът на voriconazole при хемодиализа е 121 ml/min. Четиричасовият хемодиализен сеанс не отстранява достатъчно количество voriconazole, за да се налага корекция на дозата.

Употреба при пациенти с чернодробно увреждане

При пациенти с остро чернодробно увреждане, проявяващо се с повишение на чернодробните функционални преби (ALAT, ASAT), не е необходима корекция на дозата (но се препоръчва продължително мониториране на чернодробните функционални преби за допълнително повишение).

При пациенти с лека до умерена чернодробна цироза (Child-Pugh A и B), получаващи VFEND, се препоръчва употребата на стандартен насищащ дозов режим, но поддържащата доза трябва да бъде намалена наполовина (вж. раздел 5.2).

VFEND не е изследвано при пациенти с тежка хронична чернодробна цироза (Child-Pugh C).



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

VFEND се свързва с повишение на чернодробните функционални преби и клинични белези на чернодробно увреждане като жълтеница и при пациенти с тежко чернодробно увреждане трябва да бъде употребяван само, ако ползата надвишава потенциалния рисък. Пациенти с чернодробна недостатъчност трябва да бъдат внимателно мониторирани за прояви на лекарствена токсичност (вж. също раздел 4.8).

Употреба при деца

Безопасността и ефективността при педиатрични пациенти на възраст под 2 години не е установена (вж. също раздел 5.1). Следователно voriconazole не се препоръчва при деца на възраст под 2 години. Съществуват ограничено количество данни, за да бъде определена оптималната дозировка (вж. Раздел 5.1). Въпреки това в педиатрични проучвания е била използвана следната дозировка.

Деца на възраст от 2 до < 12 години:

	Интравенозно	Перорално
<u>Насищащ дозов режим (първите 24 часа)</u>	6 mg/kg на всеки 12 часа (през първите 24 часа)	6 mg/kg на всеки 12 часа (през първите 24 часа)
<u>Поддържаща доза(след първите 24 часа)</u>	4 mg/kg два пъти дневно	4 mg/kg два пъти дневно

Приложената доза трябва да е приблизително 20 mg (0.5 ml), тъй като пероралната спринцовка е градуирана през 0.5 ml.

Фармакокинетиката и поносимостта на по-високи дози не са определяни сред педиатрични популации.

Юноши (възраст от 12 до 16 години): дозировката е както при възрастни.

4.3. Противопоказания

VFEND е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към voriconazole или към някое от помощните вещества.

Едновременното приложение на CYP3A4 субстратите terfenadine, astemizole, cisapride, pimozide или quinidine и VFEND е противопоказано, тъй като повишени плазмени концентрации на тези лекарствени продукти могат да доведат до удължаване на QTc и редки случаи на *torsades de pointes* (вж. раздел 4.5)

Едновременното приложение на VFEND и rifampicin, carbamazepine и phenobarbital е противопоказано, тъй като е възможно тези лекарствени продукти да понижат значително плазмените концентрации на voriconazole (вж. раздел 4.5).

Едновременното приложение на VFEND и efavirenz е противопоказано, защото efavirenz понижава значително плазмените концентрации на voriconazole, а VFEND от своя страна повишава значително плазмените концентрации на efavirenz (вж. раздел 4.5).

Едновременното приложение на VFEND и ritonavir (400 mg и повече два пъти дневно) е противопоказано, защото ritonavir понижава значително плазмените концентрации на voriconazole при здрави доброволци (вж. раздел 4.5).



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

Едновременното приложение на ерго-алкалоиди (ergotamine, dihydroergotamine), които са CYP3A4 субстрати е противопоказано, тъй като повишени плазмени концентрации на тези лекарствени продукти може да доведе до ерготизъм (вж. раздел 4.5).

Едновременното приложение на voriconazole и sirolimus е противопоказано, тъй като съществува вероятност voriconazole да повиши значително плазмените концентрации на sirolimus (вж. раздел 4.5).

4.4 Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба

Свръхчувствителност: Повищено внимание е необходимо при предписване на VFEND при пациенти със свръхчувствителност към други азоли (вж. също раздел 4.8).

Сърдечно-съдови:

Някои азоли, включително voriconazole, се свързват с удължаване на QT интервала. Описани са редки случаи на torsade de pointes при пациенти, приемащи voriconazole, с рискови фактори като анамнеза за кардиотоксична химиотерапия, кардиомиопатия, хипокалиемия и съпътстващо лечение, което е допринесло за това. Voriconazole трябва да бъде прилаган с повищено внимание при пациенти с потенциално проаритмични състояния като:

- Вродено или придобито удължаване на QT интервала
- Кардиомиопатия, особено при наличие на сърдечна недостатъчност
- Синусова брадикардия
- Съществуващи симптоматични аритмии
- Съпътстващо лечение, за което се знае, че удължава QT интервала

Електролитни нарушения като хипокалиемия, хипомагнезиемия и хипокалциемия трябва да бъдат мониторирани и при нужда коригирани преди започване и по време на провеждане на лечението с voriconazole (вж. раздел 4.2). При здрави доброволци беше проведено проучване, изследващо ефекта върху QT интервала на еднократни дози voriconazole, до 4 пъти по-високи от обичайната дневна доза. При нито едно от изследваните лица не е бил регистриран интервал, надхвърлящ потенциално клинично безопасната граница от 500 msec (вж. раздел 5.1).

Чернодробна токсичност: В клинични проучвания по време на лечение с VFEND са били наблюдавани не чести случаи на сериозни чернодробни реакции (включително клиничен хепатит, холестаза и фулминантна, включително и фатална чернодробна недостатъчност). Отбелязват се примери за чернодробни реакции, настъпващи при пациенти със сериозни подлежащи медицински състояния (предимно злокачествени хематологични заболявания). Транзиторни чернодробни реакции, включително хепатит и жълтеница, са настъпили сред пациенти без други идентифицирани рискови фактори. Чернодробната дисфункция обично е била обратима при прекратяване на лечението (вж. раздел 4.8).

Мониториране на чернодробната функция: В началото на лечението с voriconazole и при развитие на патологични чернодробни функционални преби по време на лечение с VFEND пациентите трябва да бъдат рутинно мониторирани за развитие на по-тежко чернодробно увреждане. Лечението на пациентите трябва задължително да включва лабораторна оценка на чернодробната функция (по-специално функционални чернодробни преби и билирубин). Спиране на VFEND трябва да се обсъди, ако клиничните белези и оплаквания съответстват на развитие на чернодробно заболяване.

Бъбречни нежелани лекарствени реакции: При тежко болни пациенти, провеждащи лечение с VFEND, е била наблюдавана остра бъбречна недостатъчност. При пациенти, лекувани с voriconazole, са подходящи за едновременно лечение с нефротоксични лекарства и съпътстващи състояния, което могат да доведат до влошаване на бъбречната функция (вж. раздел 4.8).



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

Мониториране на бъбречната функция: Пациентите трябва да бъдат мониторирани за развитие на абнормна бъбречна функция. Това задължително включва лабораторна оценка, по-специално на серумния креатинин.

Дерматологични реакции: Рядко по време на лечение с VFEND пациенти са развивали ексфолиативни реакции на кожата като синдром на Stevens-Johnson. При развитие на обрив пациентите трябва да бъдат внимателно мониторирани, а при прогресиране на лезиите VFEND трябва да бъде спрян. Освен това VFEND се свързва с кожни реакции на фоточувствителност, особено при продължително лечение. Препоръчва се пациентите да бъдат информирани по време на лечението да избягват излагане на пряка слънчева светлина.

Употреба в педиатрията: Не е установена безопасността и ефективността при педиатрични пациенти на възраст под две години (вж. също раздел 5.1).

Phenytoin (CYP2C9 субстрат и мощен CYP450 индуктор): Препоръчва се внимателно мониториране на фенитоиновите нива при едновременно приложение на phenytoin и voriconazole. Едновременното приложение на voriconazole и phenytoin трябва да се избягва, освен когато ползата надвишава риска (вж. раздел 4.5).

Rifabutin (CYP450 индуктор): При едновременно приложение на rifabutin и voriconazole се препоръчва внимателно мониториране на пълната кръвна картина и за нежелани лекарствени реакции към rifabutin (напр.uveit). Едновременното приложение на voriconazole и rifabutin трябва да се избягва, освен ако ползата не надвишава риска (вж. раздел 4.5).

Methadone (CYP3A4 субстрат). При едновременно приложение с voriconazole се препоръчва често мониториране за нежелани лекарствени реакции и токсичност, свързана с methadone, включително удължаване на QTc, тъй като след едновременно приложение на voriconazole е било наблюдавано повишение на концентрациите на methadone. Възможно е да се наложи намаляване на дозата на methadone (вж. раздел 4.5).

VFEND перорална суспенсия съдържа захароза и не трябва да се прилага при пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към фруктоза, дефицит на захаразаизомалтаза или глюкозо-галактозна малабсорбция.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия

Освен данните посочени другаде, при здрави доброволци от мъжки пол са били проведени проучвания за лекарствени взаимодействия, включващи многократно приложение до постигане на равновесни концентрации с перорален voriconazole в дозировка 200 mg два пъти дневно. Резултатите от тях съответстват на тези при други популации и начини на приложение.

В този раздел се разглеждат ефектите на други лекарствени продукти върху voriconazole, ефектите на voriconazole върху други лекарствени продукти и двупосочни взаимодействия. Взаимодействията, принадлежащи към първите две посочени категории, са представени в следния ред: противопоказания, ефекти, налагани коригиране на дозировката и внимателно клинично и/или биологично мониториране и ефекти, които не водят до значително фармакокинетично взаимодействие, но биха могли да бъдат от клиничен интерес в тази терапевтична сфера.

Ефекти на други лекарствени продукти върху voriconazole

Voriconazole се метаболизира от изоензимите на цитохром P450, CYP2C19, CYP2C9 и CYP3A4. Инхибиторите или индукторите на тези изоензими могат съответно да намалят или увеличат плазмените концентрации на voriconazole.



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

Rifampicin (CYP450 индуктор): Rifampicin (600 mg веднъж дневно) понижава C_{max} (максималната плазмена концентрация) и AUC_t (площта под кривата на времето на плазмена концентрация в границите на дозовия интервал) на voriconazole съответно с 93% и 96%. Едновременното приложение на voriconazole и rifampicin е противопоказано (вж. раздел 4.3).

Ritonavir (мощен CYP450 индуктор; CYP3A4 инхибитор и субстрат): Ritonavir (400 mg два пъти дневно) е понижил средните равновесни C_{max} и AUC_t на пероралния voriconazole съответно с 66% и 82% при здрави доброволци с изключение на един от тях, при който е било наблюдавано 2.5-кратно увеличение на AUC_t . За дози на ritonavir, по-ниски от 400 mg, не може да бъде направена екстраполация. Повторното перорално приложение на voriconazole не е довело до сигнификарен ефект върху равновесните C_{max} и AUC_t на ritonavir след приложението на повторна доза при здрави доброволци. Едновременното приложение на voriconazole и ritonavir (400 mg или повече два пъти дневно) е противопоказано (вж. раздел 4.3).

Carbamazepine и phenobarbital (мощни CYP450 индуктори): Въпреки, че не са изследвани, carbamazepine или phenobarbital вероятно понижават значително плазмените концентрации на voriconazole.

Едновременното приложение на voriconazole с carbamazepine или phenobarbital е противопоказано (вж. раздел 4.3).

Cimetidine (неспецифичен CYP450 инхибитор, повишава pH на стомаха): Cimetidine (400 mg два пъти дневно) повишава C_{max} и AUC_t на voriconazole съответно с 18% и 23%. Не се препоръчва корекция на дозата на voriconazole.

Ranitidine (повишава pH на стомаха): Ranitidine (150 mg два пъти дневно) няма значим ефект върху C_{max} и AUC_t на voriconazole.

Макролидни антибиотики: Erythromycin (CYP3A4 инхибитор; 1 g два пъти дневно) и azithromycin (500 mg веднъж дневно) нямат значим ефект върху C_{max} и AUC_t на voriconazole.

Ефекти на voriconazole върху други лекарствени продукти


Voriconazole инхибира действието на изоензимите на цитохром P450, CYP2C19, CYP2C9 и CYP3A4. Следователно, voriconazole може потенциално да повиши плазмените нива на веществата, метаболизирани се от тези CYP450 изоензими.

Terfenadine, astemizole, cisapride, primozide и quinidine (CYP3A4 субстрати): Макар и неизследвано, едновременното приложение на voriconazole и terfenadine, astemizole, cisapride, primozide или quinidine е противопоказано, тъй като повишените плазмени концентрации на тези лекарствени продукти могат да доведат до удължаване на QTc и в редки случаи настъпване на *torsades de pointes* (вж. раздел 4.3).

Sirolimus (CYP3A4 субстрат): Voriconazole повишава C_{max} и AUC_t на sirolimus (2 mg еднократна доза) съответно с 556% и 1014%. Едновременното приложение на voriconazole и sirolimus е противопоказано (вж. раздел 4.3).

Еrgo-алкалоиди (CYP3A4 субстрати): Макар и неизследвано, voriconazole може да повиши плазмените концентрации на ergo-алкалоидите (ergotamine и dihydroergotamine) и да доведе до ерготизъм. Едновременното приложение на voriconazole и ergo-алкалоиди е противопоказано (вж. раздел 4.3).

Cyclosporin (CYP3A4 субстрат): При стабилни реципиенти на бъбречен трансплантат voriconazole повишава C_{max} и AUC_t на cyclosporine съответно с минимум 13% и 70%. При започване на voriconazole при пациенти, които вече получават cyclosporine, се препоръчва дозата на cyclosporine да бъде намалена наполовина, а нивата на cyclosporine трябва да бъдат внимателно мониторирани. Повишените нива на cyclosporine са свързани с нефротоксичност.



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

При спиране на лечението с voriconazole нивата на cyclosporine трябва да бъдат внимателно мониторирани и при нужда дозата трябва да бъде повишена.

Methadone (CYP3A4 субстрат): При лица, получаващи поддържаща доза methadone (32-100 mg веднъж дневно), комбинираното приложение на перорален voriconazole (400 mg два пъти дневно за 1 ден, след това 200 mg два пъти дневно за четири дни) повишава C_{max} и AUC_t на фармакологично активния R-methadone съответно с 31% и 47%, докато C_{max} и AUC_t на S-енантиомера нараства приблизително със съответно 65% и 103%. Плазмените концентрации на voriconazole по време на едновременно приложение с methadone са били сравними с нивата на voriconazole (обобщени съществуващи данни) при здрави доброволци без друго съпътстващо лечение. По време на едновременно приложение се препоръчва често мониториране за нежелани лекарствени реакции и токсичност, свързани с повишени плазмени концентрации на methadone, включително удължаване на QT. Може да е необходимо понижение на дозата на methadone.

Tacrolimus (CYP3A4 субстрат). Voriconazole повишава C_{max} и AUC_t (площта под кривата на времето на плазмена концентрация до последното количествено доволимо измерване) на tacrolimus (0.1 mg/kg единична доза) съответно със 117% и 221%. При започване на voriconazole при пациенти, които вече получават tacrolimus, се препоръчва дозата на tacrolimus да бъде намалена до една трета от изходната доза, а нивото на tacrolimus да бъде внимателно мониторирано. Повишениите нива на tacrolimus са свързани с нефротоксичност. При прекратяване на лечението с voriconazole нивата на tacrolimus трябва да бъдат внимателно мониторирани, а дозата да бъде повишена според нуждите.

Перорални антикоагуланти:

Warfarin (CYP2C9 субстрат): Едновременното приложение на voriconazole (300 mg два пъти дневно) и warfarin (30 mg еднократна доза) повишава максималното протромбиново време с 93%. При едновременно приложение на warfarin и voriconazole се препоръчва често мониториране на протромбиновото време.

Други перорални антикоагуланти, напр. phenprocoumon, acenocoumarol (CYP2C9, CYP3A4 субстрати): Въпреки че не е изследвано, voriconazole може да повиши плазмените концентрации на кумарините и следователно да предизвика нарастване на протромбиновото време. Ако пациенти, получаващи кумаринови лекарства, се лекуват едновременно с voriconazole протромбиновото време трябва задължително да бъде мониторирано на чести интервали, а дозировката на антикоагулантите – съответно съобразена.

Сулфонилурейна група (CYP2C9 субстрати): Въпреки че не е изследвано, voriconazole може да повиши плазмените нива на сулфонилурейните лекарства (напр. tolbutamide, glipizide и glyburide) и следователно да причини хипогликемия. Препоръчва се внимателно мониториране на кръвната захар при едновременно приложение.

Статини (CYP3A4 субстрати): Въпреки че не е изследвано клинично, има доказателства, че voriconazole инхибира метаболизма на lovastatin *in vitro* (човешки чернодробни микрозоми). Следователно, съществува вероятност voriconazole да повиши плазмените нива на статини, които се метаболизират от CYP3A4. При едновременно приложение се препоръчва да се коригира дозата на статина. Повишениите статинови нива се свързват с рабдомиолиза.

Бензодиазепини (CYP3A4 субстрати): Въпреки че не е изследвано клинично, има доказателства, че voriconazole инхибира метаболизма на midazolam *in vitro* (човешки чернодробни микрозоми). Следователно, съществува вероятност voriconazole да повиши плазмените нива на бензодиазепините, които се метаболизират от CYP3A4 (midazolam и triazolam), и да доведе до удължен седативен ефект. Препоръчва се при едновременно приложение да се коригира бензодиазепиновата доза.



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

Винка-алкалоиди (CYP3A4 субстрати): Въпреки че не е изследвано, voriconazole може да повиши плазмените нива на винка-алкалоидите (напр. vincristine и vinblastine) и да доведе до невротоксичност.

Prednisolone (CYP3A4 субстрат): Voriconazole повишава C_{max} и AUC_{τ} на prednisolone (60 mg еднократна доза) съответно с 11% и 34%. Не се препоръчва корекция на дозата.

Digoxin (P-гликопротеин медиирани транспорт): Voriconazole не е показал сигнификантен ефект върху C_{max} и AUC_{τ} на digoxin (0.25 mg веднъж дневно).

Микофенолова киселина (субстрат на UDP-глюкуронил трансферазата): Voriconazole не е показал ефект върху C_{max} и AUC_{τ} на микофеноловата киселина (1 g еднократна доза).

Двупосочни взаимодействия

Phenytoin (CYP2C9 субстрат и мощен CYP450 индуктор): Едновременната употреба на voriconazole и phenytoin трябва да бъде избягвана, освен когато ползата е по-голяма от риска.

Phenytoin (300 mg веднъж дневно) понижава C_{max} и AUC_{τ} на voriconazole съответно с 49% и 69%. Voriconazole (400 mg два пъти дневно, вижте раздел 4.2) повишава C_{max} и AUC_{τ} на phenytoin (300 mg веднъж дневно) съответно с 67% и 81%. Препоръчва се внимателно мониториране на плазмените нива на phenytoin, когато phenytoin се прилага едновременно с voriconazole.

Phenytoin може да бъде приложен едновременно с voriconazole при условие, че поддържащата доза voriconazole се повиши на 5 mg/kg интравенозно два пъти дневно или от 200 mg на 400 mg перорално два пъти дневно (100 до 200 mg перорално два пъти дневно при пациенти с телесно тегло под 40 kg), вж. раздел 4.2.

Rifabutin (CYP450 индуктор): Едновременната употреба на voriconazole и rifabutin трябва да бъде избягвана, освен ако ползата не надвишава риска. Rifabutin (300 mg веднъж дневно) понижава C_{max} и AUC_{τ} на voriconazole в доза 200 mg два пъти дневно съответно с 69% и 78%. По време на едновременно приложение с rifabutin C_{max} и AUC_{τ} на voriconazole в доза 350 mg два пъти дневно са били съответно 96% и 68% от нивата при самостоятелно приложение в доза 200 mg два пъти дневно. При доза на voriconazole 400 mg два пъти дневно C_{max} и AUC_{τ} са били съответно със 104% и 87% по-високи, отколкото при самостоятелно приложение на voriconazole в доза 200 mg два пъти дневно. Voriconazole в доза 400 mg два пъти дневно е повишил C_{max} и AUC_{τ} на rifabutin съответно със 195% и 33%.

Ако едновременното приложение на rifabutin и voriconazole е оправдано, то тогава поддържащата доза на voriconazole може да бъде повищена до 5 mg/kg интравенозно два пъти дневно или от 200 на 350 mg перорално два пъти дневно (100 до 200 mg перорално два пъти дневно при пациенти с телесно тегло под 40 kg) (вж. раздел 4.2). При едновременно приложение на rifabutin и voriconazole се препоръчва внимателно мониториране на пълната кръвна картина и за нежелани лекарствени реакции към rifabutin (напр. увент).

Omeprazole (CYP2C19 и инхибитор; CYP2C19 и CYP3A4 субстрат): Omeprazole (40 mg веднъж дневно) повишила C_{max} и AUC_{τ} на voriconazole съответно с 15% и 41%. Не се препоръчва корекция на дозата на voriconazole. Voriconazole повишила C_{max} и AUC_{τ} на omeprazole съответно със 116% и 280%. При започване на терапия с voriconazole при пациенти, получаващи вече omeprazole, се препоръчва намаляване наполовина на дозата на omeprazole. Метаболизъмът на други инхибитори на протонната помпа, които са CYP2C19 субстрати, също може да бъде инхибиран от voriconazole.

Indinavir (CYP3A4 инхибитор и субстрат): Indinavir (800 mg три пъти дневно) няма сигнификантен ефект върху C_{max} , C_{min} и AUC_{τ} на voriconazole.



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

Voriconazole няма съгнificantен ефект върху C_{max} и AUC_t на indinavir (800 mg три пъти дневно).

Efavirenz (ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (CYP450 индуктор; CYP3A4 инхибитор и субстрат): В равновесни концентрации efavirenz (400 mg перорално веднъж дневно) е понижил средните равновесни C_{max} и AUC_t на voriconazole съответно с 61% и 77% при здрави доброволци. В същото проучване voriconazole в равновесни концентрации при здрави доброволци е повишил средните равновесни C_{max} и AUC_t на efavirenz съответно с 38% и 44%. Едновременното приложение на voriconazole и efavirenz е противопоказано вж. раздел 4.3).

Други инхибитори на HIV-протеазата (CYP3A4 инхибитори): *In vitro* проучвания предполагат, че voriconazole може да бъде инхибиран метаболизма на инхибитори на HIV-протеазата (напр. saquinavir, amprenavir и nelfinavir). *In vitro* проучвания показват също, че метаболизът на voriconazole може да бъде инхибиран от инхибитори на HIV-протеазата. Резултатите от едновременното приложение на voriconazole с други инхибитори на HIV-протеазата, обаче, не могат да бъдат предвидени при человека само с *in vitro* проучвания. Пациентите трябва да бъдат внимателно мониторирани за настъпване на лекарствена токсичност и/или загуба на ефект по време на едновременно приложение на voriconazole и инхибитори на HIV-протеазата.

Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI) (CYP3A4 субстрати, инхибитори или CYP450 индуктори): *In vitro* проучвания показват, че метаболизът на voriconazole може да бъде инхибиран от delavirdine. Въпреки че не е изследван, метаболизът на voriconazole може да бъде индуциран от nevirapine. Едно *in vivo* проучване е показвало, че voriconazole инхибира метаболизма на efavirenz. Voriconazole може също да инхибира метаболизма на NNRTI, освен този на efavirenz. Пациентите трябва да бъдат внимателно мониторирани за всяко настъпване на лекарствена токсичност и/или липса на ефект по време на комбинирано приложение на voriconazole и NNRTI. Едновременното приложение на voriconazole и efavirenz е противопоказано (вж. раздел 4.3).

Voriconazole трябва да бъде прилаган с повишено внимание при пациенти със съпътстващо лечение, за което се знае че удължава QT интервала. Когато съществува и потенциална възможност voriconazole да повиши плазмените нива на вещества, метаболизирани се от CYP3A4 изoenзими (някои антихистамини, quinidine, cisapride, primozide) едновременното приложение е противопоказано (вж. раздел 4.3).

4.6. Бременност и кърмене

Бременност

Липсва адекватна информация за употребата на VFEND при бременни жени.

Проучвания при животни са показвали репродуктивна токсичност (вж. раздел 5.3). Потенциалният рисък при человека е неизвестен.

VFEND не трябва да бъде прилаган при бременност, освен ако ползата при майката отчетливо надвишава потенциалния рисък за плода.

Жени в детеродна възраст

Жени в детеродна възраст трябва винаги да използват ефективна контрацепция по време на лечението.

Кърмене

Ексекрецията на voriconazole в майчиното мляко не е изследвана. Кърменето трябва да бъде прекратено при започване на лечението с VFEND.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

Voriconazole може да причини преходни и обратими промени в зрението, включително замъглено видждане, променени/засилени зрителни възприятия и/или фотофобия. Докато имат такива оплаквания, пациентите трябва да избягват потенциално рискови задачи, като шофиране или работа с машини.


4.8. Нежелани лекарствени реакции

Профилът на безопасност на voriconazole се основава на интегрирана база данни за безопасността при повече от 2000 лица (1655 пациенти в терапевтични проучвания). Те представляват хетерогенна популация, включително пациенти с малигнени хематологични заболявания, инфектирани с HIV пациенти с езофагеална кандидоза или рефрактерни микотични инфекции, не-неутропенични пациенти с кандидемия или аспергилоза и здрави доброволци. Петстотин шестдесет и един пациенти са били лекувани с voriconazole в продължение на повече от 12 седмици, а 136 от тях са получавали voriconazole над 6 месеца.

В следващата таблица, като се има предвид че мнозинството от проучванията са имали открит характер, са включени според засегнатите органи системи и честотата си (много чести >1/10, чести >1/100 и <1/10, не чести >1/1000 и <1/1000, редки <1/1000) всички каузални нежелани лекарствени реакции. Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции са били зрителни смущения, фебрилитет, обрив, повръщане, гадене, диария, главоболие, периферен оток и болки в корема. Тежестта на нежеланите лекарствени реакции е била като цяло лека до умерена. При анализа на данните за безопасност не са установени клинично сънгификантни разлики по възраст, раса или пол.

Нежелани лекарствени реакции при лица, получаващи voriconazole

Органни системи	Нежелани лекарствени реакции
Организмът като цяло	
Много чести	Фебрилитет, главоболие, болки в корема
Чести	Студени тръпки, астения, болки в гърба, гръден болка, реакции/възпаление в мястото на инжектиране, оток на лицето, трипоподобен синдром
Не чести	Алергична реакция, анафилактоидна реакция, ангиоедем, перитонит
Сърдечно-съдова система	
Чести	Хипотония, тромбофлебит, флебит
Не чести	Предсърдна аритмия, брадикардия, синкоп, тахикардия, камерна аритмия, камерно мъждене, надкамерна тахикардия, удължаване на QT интервала
Редки	Пълен AV блок, бедрен блок, нодална аритмия, камерна тахикардия, torsade de pointes
Храносмилателна система	
Много чести	Гадене, повръщане, диария
Чести	Повишение на функционалните чернодробни преби (включително ASAT, ALAT, алкална фосфатаза, GGT, LDH, билирубин), жълтеница, хейлит, холестатична жълтеница, гастроентерит
Не чести	Холецистит, холелитиаза, констипация, дуоденит, диспепсия, увеличение на черния дроб, гингивит, глосит, хепатит



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

	чернодробна недостатъчност, панкреатит, едем на езика
Редки	Псевдомемброзен колит, хепатална кома
Ендокринна система	
Не чести	Адренокортикална недостатъчност
Кръв и лимфна система	
Чести	Тромбоцитопения, анемия (включително макроцитна, микроцитна, нормоцитна, мегалобластна, апластична), левкопения, панцитопения, пурпура
Не чести	Лимфаденопатия, агранулоцитоза, еозинофилия, дисеминирана вътресъдова коагулация, костно-мозъчна супресия
Редки	Лимфангит
Метаболизъм и хранене	
Много чести	Периферни отоци
Чести	Хипокалиемия, повишен креатинин, хипогликемия
Не чести	Повищена урея, албуминурия, хиперхолестеролемия
Редки	Хипертиреоидизъм, хипотиреоидизъм
Скелетно-мускулна система	
Не чести	Артрит
Нервна	
Чести	Виене на свят, халюцинации, обърканост, депресия, тревожност, трепор, възбуда, парестезии
Не чести	Атаксия, мозъчен оток, диплопия, хипестезия, нистагъм, вертиго
Редки	Синдром на Guillain-Barre, окуло-гирусна криза, хипертония, екстрапирамиден синдром, безсъние, енцефалопатия, сънливост по време на инфузията
Дихателна система	
Чести	Респираторен дистрес-синдром, белодробен оток, синуит
Кожа и придатъци	
Много чести	Обрив
Чести	Пруритус, макулопапулозен обрив, кожни реакции на фоточувствителност, алопеция, ексфолиативен дерматит
Не чести	Доказана лекарствена ерупция, екзема, псориазис, синдром на Stevens-Johnson, уртикария
Редки	Дискоиден лупус еритематозус, еритема мултиформе, токсична епидермална некролиза
Специализирани сетивни органи	
Много чести	Зрителни нарушения (включително променени/засилени зрителни възприятия, намаление на ERG амплитудата, замъглено виждане, промени в цветното зрение, фотография)
Не чести	Блефарит, неврит на н. opticus, папилефем;

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

	склерит, променени вкусови възприятия
Редки	Кръвоизлив на ретината, помътняване на роговицата, атрофия на п. opticus, хипакузис, тинитус
Урогенитална система	
Чести	Остра бъбречна недостатъчност, хематурия
Не чести	Нефрит
Редки	Бъбречна тубуларна некроза

Промени във вкусовите усещания

В комбинирани данни от три проучвания за биоеквивалентност, включващи употреба на прах за перорална суспенсия, е бил регистриран променен вкус във връзка с лечението при 12 лица (14%).

Зрителни нарушения

Зрителните нарушения, свързани с лечение с voriconazole са били много чести. В краткосрочни, както и дългосрочни, клинични проучвания приблизително 30% от лицата са получили променени/засилени зрителни възприятия, замъглено виддане, промени в цветното виддане или фотофобия. Зрителните нарушения са преходни и напълно обратими, като мнозинството от тях преминават спонтанно в рамките на 60 минути и не са били наблюдавани клинично значими дълготрайни зрителни ефекти. Има данни за отслабване на тези ефекти при повторни дози voriconazole. Зрителното нарушение по принцип е леко, рядко води до прекратяване на лечението и не е свързано с дълготрайни последствия. Зрителните нарушения вероятно са свързани с по-високи плазмени концентрации и/или дози.

Механизмът на действие е неизвестен, въпреки че мястото на действието е най-вероятно в ретината. В проучване при здрави доброволци изследващо влиянието на voriconazole върху функцията на ретината voriconazole е предизвикал намаление на амплитудата на ретинограмата (ERG). ERG измерва електрическите токове в ретината. ERG промените не са прогресирали в рамките на 29-дневното лечение и са били напълно обратими след спиране на voriconazole.

Дерматологични реакции

Дерматологичните реакции са били чести при пациенти, лекувани с voriconazole в клинични проучвания, но тези пациенти са имали сериозни подлежащи заболявания и са получавали множество съпътстващи лекарства. Мнозинството от обривите са били леки до умерени по тежест. Пациентите рядко са развивали сериозни кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson, токсична епидермална некролиза и еритема мултиформе по време на лечение с VFEND.

Ако пациентът развие обрив, той трябва да бъде често мониториран и VFEND да бъде спрян, ако лезиите прогресират. Съобщава се за реакции на фоточувствителност, особено при дълготрайно лечение (вж. също раздел 4.4).

Чернодробни функционални преби

Общата честота на клинично значимите отклонения в трансаминазите в програмата за клинично проучване на voriconazole е 13.4% (200/1493) от лицата, лекувани с voriconazole. Отклоненията в чернодробните функционални преби са претърпяли обратно развитие както по време на лечението без корекция на дозата, така и след съобразяване на дозата, включително и спиране на лечението.

Voriconazole се свързва не често със случаи на сериозна чернодробна токсичност при пациенти с други сериозни подлежащи състояния. Това включва случаи на жълтеница и редки случаи на хепатит и чернодробна недостатъчност, водеща до смърт (вж. раздел 4.4).

4.9. Предозиране



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

В клинични проучвания е имало 3 случая на случайно предозиране. Всичките са настъпили при педиатрични пациенти, които са получили до пет пъти по-голяма от препоръчваната интравенозна доза voriconazole. Съобщава се за единичен случай на фотофобия с продължителност 10 минути.

Не е известно да има антидот на voriconazole.

Клирънсът на voriconazole при хемодиализа е 121 ml/min. В случай на предозиране хемодиализата може да помогне за отстраняване на voriconazole от организма.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ

5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: ATC код: J02A C03

Антимикотични агенти за системно приложение – Триазолови производни

Механизъм на действие

In vitro voriconazole проявява широкоспектърна антимикотична активност с антимикотичен ефект срещу *Candida* spp. (включително fluconazole-резистентни *C. krusei* и резистентни щамове *C. glabrata* и *C. albicans*) и фунгицидна активност срещу всички тествани видове *Aspergillus*. Допълнително voriconazole показва *in vitro* фунгицидна активност срещу изолирани се микотични патогени, включително и тези като *Scedosporium* или *Fusarium*, които имат ограничена чувствителност към съществуващите антимикотични лекарства. Начинът му на действие е инхибиране на микотичното цитохром P450-медирано 14α-стерол деметилиране, основно стъпало в биосинтезата на ергостерол.

В проучвания при животни съществува корелация между стойностите на минималната инхибираща концентрация и ефикасността срещу експериментални микози. За разлика от това, в клинични проучвания изглежда липсва корелация между стойностите на минималната инхибираща концентрация и клиничните резултати. Нещо повече, изглежда липсва корелация между плазмените нива и клиничния резултат. Това е типично за азоловите антимикотици.

Микробиология

Клинична ефективност (с частичен или пълен отговор, вж. по-долу при Клиничен опит) беше демонстрирана за *Aspergillus* spp., включително *A. flavus*, *A. fumigatus*, *A. terreus*, *A. niger*, *A. nidulans*, *Candida* spp., включително *C. albicans*, *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. parapsilosis* и *C. tropicalis* и ограничен брой *C. dubliniensis*, *C. inconspicua* и *C. guilliermondii*, *Scedosporium* spp., включително *S. apiospermum*, *S. prolificans* и *Fusarium* spp.

Други лекувани микотични инфекции (с често частичен или пълен отговор) са били изолирани случаи на инфекция с *Alternaria* spp., *Blastomyces dermatidis*, *Blastoschizomyces capitatus*, *Cladosporium* spp., *Coccidioides immitis*, *Conidiobolus coronatus*, *Cryptococcus neoformans*, *Exserohilum rostratum*, *Exophiala spinifera*, *Fonsecaea pedrosoi*, *Madurella mycetomatis*, *Paecilomyces lilacinus*, *Penicillium* spp., включително *P. marneffei*, *Phialophora richardsiae*, *Scopulariopsis brevicaulis* и *Trichosporon* spp., включително *T. beigelii*.

In vitro активност срещу клинични изолати беше наблюдавана за *Acremonium* spp., *Alternaria* spp., *Bipolaris* spp., *Cladophialophora* spp., *Histoplasma capsulatum*, като повечето случаи бяха потиснати от концентрации на voriconazole в границите от 0.05 до 2 µg/ml.

Беше демонстрирана *in vitro* активност срещу патогените *Curvularia* spp. и *Sporothrix* spp., но клиничната значимост е неизвестна.

Пробите за култивиране на гъбички и други специфични лабораторни изследвания (серологични, хистопатологични) трябва да бъдат взети преди започване на лечението с цел изолиране и идентифициране на причиняващите микроорганизми. Лечението може да бъде



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

започнато преди получаване на резултатите от културите и другите лабораторни изследвания, но след получаване на тези резултати лечението на инфекцията трябва да бъде коригирано по съответния начин.

Идентифицирани са клинични изолати с понижена чувствителност към voriconazole. Независимо от това, повишенните минимални инхибиращи концентрации не винаги корелират с клиничен неуспех и при пациенти, инфицирани с микроорганизми, резистентни на други азоли, е наблюдаван клиничен успех. Поради комплексното състояние на пациентите, включени в клиничните проучвания, е трудно да бъде направена корелация между *in vitro* активност и клиничен резултат и все още предстои да бъдат установени границите на ефикасност на voriconazole.

Клиничен опит

Успешният резултат в тази част се дефинира като пълен или частичен терапевтичен отговор.

Aspergillus инфекции – ефикасност при аспергилозни пациенти с лоша прогноза

Voriconazole има *in vitro* фунгицидна активност срещу *Aspergillus* spp. В рандомизирано, многоцентрово открито проучване при 277 имунокомпрометирани пациенти, лекувани в продължение на 12 седмици, беше демонстрирано, че първичното лечение на острата инвазивна аспергилоза с voriconazole е ефикасно и свързано с по-добра преживяемост спрямо конвенционалното лечение с amphotericin B. Задоволителен глобален отговор (пълно или частично обратно развитие на всички съответстващи на заболяването симптоми и белези и първоначално установени рентгенови/бронхоскопски промени) е бил наблюдаван при 53% от лекуваните с voriconazole пациенти в сравнение с 31% от пациентите, лекувани с amphotericin B. Преживяемостта към 84-ия ден е била статистически значимо по-висока с voriconazole, отколкото с референтното лекарство, а по отношение на времето до настъпване на смъртта и времето до прекъсване на лечението поради прояви на токсичност проучването доказва клинична и статистически значима полза от voriconazole.

Това проучване потвърждава данните от по-ранно проспективно проучване, при което е имало положителен резултат при лица с рискови фактори за лоша прогноза, включително тези с реакция на отхвърляне на трансплантанта, и в частност при мозъчни инфекции (обикновено свързани с почти 100% смъртност).

Проучванията са включвали аспергилоза на мозъка, синусите, белите дробове и дисеминирана аспергилоза при пациенти с трансплатация на костен мозък и солидни органи, злокачествени хематологични заболявания, рак и СПИН.

Кандидемия при пациенти без неутропения

Ефикасността на voriconazole в сравнение с терапевтична схема, включваща amphotericin B, последван от fluconazole при първично лечение на кандидемия беше демонстрирана в отворено сравнително проучване. В проучването са включени 370 пациенти без неутропения (на възраст над 12 години) с документирана кандидемия, 248 от които са били лекувани с voriconazole. Девет пациента в групата, лекувана с voriconazole и пет в групата, лекувана с amphotericin B, последван от fluconazole, са имали микологично доказана инфекция на дълбоките тъкани. Пациенти с бъбречна недостатъчност са били изключени от това проучване. Средната продължителност на лечението е била 15 дни и в двете терапевтични рамена. В първичния анализ успешният терапевтичен отговор (оценката е направена от Комисия за анализ на данните (Data Review Committee [DRC]) по сляп начин спрямо изпитваното лекарство) се дефинира като обратно развитие/подобрение на всички клинични белези и субективни симптоми на инфекция с унищожаване на *Candida* в кръвта и инфициранияте дълбоки тъкани 12 седмици след края на лечението. Пациентите, които не са били оценени 12 седмици след края на лечението, са били причислени към категорията неуспешно лечение. В този анализ



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

успешен терапевтичен отговор е отчетен при 41% от пациентите и в двете терапевтични рамена.

При вторичния анализ, при който са използвани оценките на DRC в крайния срок, позволяващ оценка на резултатите (в края на лечението или 2, 6 или 12 седмици след края на лечението) voriconazole и терапевтичният режим, включващ amphotericin B, последван от fluconazole, са показвали терапевтичен успех при съответно 65% и 71% от пациентите. Оценката на Изследователя за успешен резултат във всеки от тези срокове е показана в следващата таблица.

<i>Sрок</i>	<i>Voriconazole (N=248)</i>	<i>Amphotericin B → fluconazole (N=122)</i>
В края на лечението	178 (72%)	88 (72%)
2 седмици след края на лечението	125 (50%)	62 (51%)
6 седмици след края на лечението	104 (42%)	55 (45%)
12 седмици след края на лечението	104 (42%)	51 (42%)

Липсват данни за деца на възраст под 12 години при тези показания.

Sериозни рефрактерни *Candida* инфекции

Проучването включва 55 пациенти със сериозни рефрактерни системни *Candida* инфекции (включително кандидемия, дисеминирана и други инвазивни кандидози), при които проведеното антимикотично лечение, по-специално с fliconazole, е било неефективно. Успешен терапевтичен отговор е бил наблюдаван при 24 пациенти (при 15 – пълен, а при 9 – частичен). При *fluconazole*-резистентни щамове, непринадлежащи към *C. Albicans*, успешен изход е бил отчетен при 3/3 случая с *C. krusei* (пълен терапевтичен отговор) и при 6/8 случая с *C. glabrata* (5 с пълен терапевтичен отговор, 1 с частичен отговор) инфекции. Данните за клинична ефикасност са били подкрепени от ограничено количество данни за чувствителност.

***Scedosporium* и *Fusarium* инфекции**

Беше доказано, че voriconazole е ефективен срещу следните редки причинители на микоза:

Scedosporium spp.: Успешен терапевтичен отговор към лечение с voriconazole е бил наблюдаван при 16 (6 с пълен, 10 с частичен отговор) от 28 пациенти със *S. apiospermum* и при 2 (и двата с частичен отговор) от 7 пациенти със *S. Prolificans* инфекция. Освен това, успешен отговор е бил наблюдаван при 1 от 3 пациенти с инфекции, причинени от повече от един микроорганизъм включително *Scedosporium* spp.

Fusarium spp.: Седем (3 с пълен, 4 с частичен отговор) от 17 пациенти са били лекувани успешно с voriconazole. От тези 7 пациенти: трима са имали очна инфекция, един – инфекция на синусите, а трима са имали дисеминирана инфекция. Освен това, четири пациенти с фузариоза са имали инфекция, причинена от няколко микроорганизма, при двама от тях е отчетен успешен резултат.

Мнозинството от пациентите, лекувани с voriconazole за горепосочените редки инфекции, са били с непоносимост или рефрактерност към предшестващото антимикотично лечение.

Продължителност на лечението

В клинични проучвания 561 пациенти са били лекувани с voriconazole за повече от 12 седмици, като 136 пациенти са получавали voriconazole над 6 месеца.

Клиничен опит при педиатрични пациенти



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

VFEND® powder for oral suspension

Лечение с voriconazole е провеждано при 61 педиатрични пациенти на възраст от 9 месеца до 15 години с доказана или вероятна микотична инфекция. Тази популация включва 34 пациенти на възраст от 2 до < 12 години и 20 пациенти на възраст 12-15 години.

При мнозинството от тях (57/61) предшестващото антимикотично лечение е било неуспешно. Терапевтичните проучвания включват 5 пациенти на възраст 12-15 години, останалите пациенти са получили voriconazole по благотворителни програми. Подлежащите заболявания при тези пациенти са били злокачествени хематологични заболявания и апластична анемия (27 пациенти) и хронична грануломатоза (14 пациенти). Най-честата лекувана микотична инфекция е била аспергилоза (43/61; 70%).

Клинични проучвания, изследващи влиянието върху QT интервала

Едно плацебо-контролирано, рандомизирано кръстосано проучване с единократна доза е било проведено с цел оценка на ефекта върху QT интервала при здрави доброволци с три перорални дозировки voriconazole и ketoconazole. Плацебо-коригираното средно максимално удължаване на QTc спрямо изходната стойност след 800, 1200 и 1600 mg voriconazole е било съответно 5.1, 4.8 и 8.2 msec, а след 800 mg ketoconazole – 7.0 msec. Нито един участник в която и да е група не е получил удължаване на QTc \geq 60 msec спрямо изходната стойност. При нито едно лице този интервал не е надхвърлил потенциалния клинично значим праг от 500 msec.

5.2. Фармакокинетични свойства

Основни фармакокинетични характеристики

Фармакокинетиката на voriconazole е определена при здрави лица, специфични популации и пациенти. По време на перорално приложение на 200 mg или 300 mg два пъти дневно за 14 дни при пациенти с повишен рисък от аспергилоза (главно пациенти със злокачествени новообразувания на лимфните или хемопоетични тъкани) наблюдаваните фармакокинетични характеристики – бърза и значителна абсорбция, акумулация и нелинейна фармакокинетика, съответстват на тези, наблюдавани при здрави доброволци.

Фармакокинетиката на voriconazole има нелинеен характер поради насищане на неговия метаболизъм. При повишаване на дозата се наблюдава по-голямо пропорционално нарастване при експозиция. Изчислено е, че увеличаването на пероралната доза от 200 mg два пъти дневно на 300 mg два пъти дневно води до средно 2.5-кратно повишение на експозицията (AUC_r). Ако се приложат препоръчваните интравенозни или перорални насищащи дози в рамките на първите 24 часа от приложението се достигат плазмени концентрации, близки до равновесните. Без приложение на насищаща доза натрупването се осъществява чрез многократно приложение два пъти дневно, при което равновесни плазмени концентрации на voriconazole за повечето лица се достигат към 6th ден.

Абсорбция

След перорално приложение voriconazole се абсорбира почти напълно, като максимална плазмена концентрация (C_{max}) се достига 1-2 часа след приложението. Абсолютната бионаличност на voriconazole след перорално приложение се изчислява на 96%. Установена е биоеквивалентност между таблетки от 200 mg и пероралната супензия, съдържаща 40 mg/ml, приложена като доза от 200 mg. При многократно приложение на voriconazole перорална супензия едновременно с богата на мазнини храна C_{max} и AUC_r се понижават съответно с 58% и 37%. Абсорбцията на voriconazole не се влияе от промените в pH на stomаха.

Разпределение

Обемът на разпределение при равновесни концентрации на voriconazole се изчислява на 4.6 l/kg, което предполага екстензивно разпределение в тъканите. Свързването с плазмени протеини е 58%.

Пробите от гръбначно-мозъчна течност на осем пациенти, включени в благотворителна програма, са показвали установими концентрации от voriconazole при всички пациенти.



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

Метаболизъм

In vitro проучвания показват, че voriconazole се метаболизира от чернодробните цитохром P450 изоензими CYP2C19, CYP2C9 и CYP3A4.

Индивидуалните различия във фармакокинетиката на voriconazole са големи.

In vivo проучвания показват, че CYP2C19 участва значимо в метаболизма на voriconazole. Този ензим проявява генетичен полиморфизъм. Например, очакванията са, че 15-20% от азиатското население са лоши метаболизатори. При кавказката (бялата) и черната раса честотата на лошите метаболизатори е 3-5%. Проучвания, проведени при здрави доброволци от кавказката раса и Япония сочат, че лошите метаболизатори показват средно 4 пъти по-висока експозиция (AUC_r) към voriconazole, отколкото съответните им хомозиготни екстензивни метаболизатори. Лица, които са хетерозиготни екстензивни метаболизатори, показват средно 2 пъти по-висока експозиция към voriconazole, отколкото техните хомозиготни екстензивни метаболизатори.

Основен метаболит на voriconazole е неговият N-оксид, който съставлява 72% от циркулиращите радиобелязани метаболити в плазмата. Този метаболит има минимална антимикотична активност и не допринася за общата ефикасност на voriconazole.

Екскреция

Voriconazole се елиминира чрез чернодробен метаболизъм, като по-малко от 2% от приложената доза се екскретира в непроменен вид в урината.

След приложение на радиобелязан voriconazole приблизително 80% от радиоактивността се открива в урината при многократно интравенозно въвеждане, а 83% се откриват в урината при многократно перорално приложение. И при перорално, и при интравенозно приложение повечето (> 94%) от общата радиоактивност се екскретира през първите 96 часа.

Крайният полуживот на voriconazole зависи от приложената доза и е приблизително 6 часа при 200 mg (перорална) доза. Поради нелинейната фармакокинетика, крайният полуживот няма значение за предсказване на кумулирането или елиминирането на voriconazole.

Фармакокинетични-фармакодинамични взаимодействия

В 10 терапевтични проучвания средните стойности на средните и максималните плазмени концентрации при отделните участници в проучванията са били съответно 2425 $\mu\text{g/ml}$ (средно една четвърт в диапазон от 1193 до 4380 $\mu\text{g/ml}$) и 3742 $\mu\text{g/ml}$ (средно една четвърт в диапазон от 2027 до 6302 $\mu\text{g/ml}$). В терапевтичните проучвания не се установява положителна зависимост между средна, максимална или минимална плазмена концентрация и ефикасността на voriconazole.


Анализите фармакокинетика-фармакодинамика на данните от клиничните проучвания разкриват положителна зависимост между плазмените концентрации на voriconazole, и настъпилите отклонения в чернодробните функционални преби и зрителни смущения.

Фармакокинетика при специфични групи пациенти

Пол

В едно проучване с многократна перорална доза стойностите на C_{\max} и AUC_r при здрави доброволци от женски пол са били съответно с 83% и 113% по-високи, отколкото при здрави доброволци от мъжки пол (18-45 години). В същото проучване не са били наблюдавани сигнificantни разлики между стойностите на C_{\max} и AUC_r на здрави доброволци в напреднала възраст от мъжки пол и здрави доброволци в напреднала възраст от женски пол (≥ 65 години).

В клиничната програма не е била правена корекция на дозата въз основа на пола. Профилът на безопасност и плазмените концентрации, наблюдавани при пациенти от мъжки и женски



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

пол, са били сходни. Следователно не е необходима корекция на дозата в зависимост от половата принадлежност.

Пациенти в напреднала възраст

В едно проучване с многократна перорална доза стойностите на C_{max} и AUC_t при здрави доброволци в напреднала възраст от мъжки пол (≥ 65 години) са били съответно с 61% и 86% по-високи, отколкото при здрави млади доброволци от мъжки пол (18-45 години). Липсват сигнificantни разлики между стойностите на C_{max} и AUC_t при здрави доброволци в напреднала възраст от женски пол (≥ 65 години) и здрави млади доброволци от женски пол (18-45 години).

В терапевтичните проучвания не е била правена корекция на дозата въз основа на възрастта. Наблюдавана е зависимост между плазмената концентрация и възрастта. Профилът на безопасност на voriconazole при млади и в напреднала възраст пациенти е бил сходен и следователно корекция на дозата при пациенти в напреднала възраст не е необходима (вж. раздел 4.2).

Бъбречно увреждане

В едно проучване с еднократна перорална доза (200 mg) при лица с нормална бъбречна функция и леко (креатининов клирънс 41-60 ml/min) до тежко (креатининов клирънс <20 ml/min) бъбречно увреждане фармакокинетиката на voriconazole не е била сигnificantно повлияна от бъбречното увреждане. Свързването на voriconazole с плазмените протеини е било сходно при лица с различни степени на бъбречно увреждане. Вж. препоръките за дозиране и мониториране, изложени в раздели 4.2 и 4.4.

Чернодробно увреждане

След единична перорална доза (200 mg) AUC е била с 233% по-висока при лица с лека до умерена чернодробна цироза (Child-Pugh A и B) в сравнение с лица с нормална чернодробна функция. Свързването на voriconazole с протеините не е било засегнато от увредената чернодробна функция.

В проучване с многократно перорално дозиране стойностите на AUC_t са били сходни при лица с умерена чернодробна цироза (Child-Pugh B), получаващи поддържаща доза 100 mg два пъти дневно и лица с нормална чернодробна функция, получаващи 200 mg два пъти дневно. Липсват фармакокинетични данни при пациенти с тежка чернодробна цироза (Child-Pugh C). Вж. препоръките за дозиране и мониториране, изложени в раздели 4.2 и 4.4.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Проучвания за повторна дозова токсичност с voriconazole са показвали, че черният дроб е прицелният орган. Подобно на други антимикотични лекарства хепатотоксичност е била наблюдавана при плазмени експозиции сходни с тези, получени в терапевтични дози при човека. При пълхове, мишки и кучета voriconazole е причинил и минимални промени в надбъбречните жлези. Конвенционалните проучвания за безопасна фармакология, генотоксичност или карциногенен потенциал не са разкрили специфичен рисък за човека.

Репродуктивни проучвания показват, че voriconazole е тератогенен при пълхове и ембриотоксичен при зайци при системни експозиции, равни на тези, получени при хора в терапевтични дози. В проучване на пре- и постнаталното развитие при пълхове при експозиции, по-ниски от тези, получени при хора в терапевтични дози, voriconazole е увеличил продължителността на гестацията и родовата дейност и е предизвикал дисто^г-следваща майчина смъртност и понижена перинатална преживяемост на новородените. Ефектите върху периода на раждане са вероятно медирирани от видово-специфични механизми, включително понижение на естрадиоловите нива и съответстват на тези, наблюдавани при други азолови антимикотични лекарства.



6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ СВОЙСТВА

6.1. Списък на помощните вещества

Sucrose (0.54 g на ml супенсия)
Silica, Colloidal
Titanium Dioxide (E171)
Xanthan Gum
Sodium Citrate
Sodium Benzoate (E211)
Citric Acid
Natural Orange Flavour (съдържаща orange oil, maltodextrin и tocopherol)

6.2. Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други лекарствени продукти, освен упоменатите в раздел 6.6. Не се предвижда супенсията да бъде допълнително разреждана с вода или други разтворители.

6.3. Срок на годност

Срокът на годност на праха за перорална супенсия е 18 месеца.
Срокът на годност на разтворената супенсия е 14 дни.

6.4. Специални предпазни мерки при съхранение

Прах за перорална супенсия: преди разтварянето се съхранява при температура 2°C – 8°C (в хладилник).

Приготвена супенсия: да не се съхранява при температура над 30°C, да не се съхранява в хладилник и фризер.

Контеинерът трябва да бъде пътно затворен.

Цялото количество неупотребена супенсия трябва да бъде изхвърлено 14 дни след приготвяне на разтвора.

6.5. Вид и съдържание на опаковката

Една бутилка от 100 ml от полиетилен с висока плътност (HDPE) (с полипропиленова защитена капачка) съдържа 45 g прах за перорална супенсия. След разтваряне обемът на супенсията е 75 ml, което съответства на използваем обем от 70 ml.

Опаковката съдържа също мерителна чашка (с черта съответстваща на 23 ml), 5-ml перорална спринцовка и адаптер на бутилката.

Съдържание на опаковката: 1 бутилка.

6.6 Указания за употреба и изхвърляне

Инструкции за приготвяне:

- Натиснете капачката на бутилката, за да освободи праха.
- Измерете 23 ml вода като напълните мерителната чашка до ръба на маркираната върху нея линия. Налейте водата в бутилката. С помощта на чашката измерете още 23 ml вода и я добавете към тази в бутилката.
- Разклащайте енергично затворената бутилка в продължение на около 1 минута.
- Отстранете защитената капачка. Вкарайте чрез натиск адаптера в гърлото на бутилката.
- Поставете пак капачката на бутилката.
- Напишете срока на годност на приговената супенсия върху етикета на бутилката (срокът на годност на приговената супенсия е 14 дни).



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
VFEND® powder for oral suspension

Инструкции за употреба:

Преди всяка употреба разклащайте затворената бутилка с приготвената суспенсия в продължение на приблизително 10 секунди.

Веднъж приготвена, пероралната суспенсия VFEND трябва да бъде прилагана само с помощта на пероралната спринцовка, съдържаща се във всяка опаковка. За по-подробни инструкции за употреба прочетете листовката за пациента.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

PFIZER EUROPE MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ

8. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

10. ДАТА НА (ЧАСТИЧНА) АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА

